

Les noms français des champignons

Genres traités :

Agarics
Alnicoles
Amanites
Armillaires
Bolbities
Bolets
Calocères
Chanterelles
Clathres
Clavaires
Clitocybes
Clitopiles
Collybies
Conocybes
Coprins
Lactaires
Leucopaxilles
Oreilles
Polypores et affines
Russules
Tricholomes
Typhules

Par le Comité pour les Noms Français des Champignons

Régis COURTECUISSÉ	Paul PIROT
Georges FANNECHÈRE	Guy REDEUILH †
Claude LEJEUNE †	Jean ROVÉA
Jean-Paul MAURICE	Fabrice TOSELLO
Jacques MELOT	Jean-Jacques WUILBAUT
Pierre-Arthur MOREAU	

Avec la collaboration de la Société Mycologique de France

Juillet 2011

Présentation

En 1998, plusieurs abonnés du forum internet Mycologia europaea avaient fait part de leur embarras quand ils avaient besoin de nommer des champignons en français, pour des publics aussi divers que le corps médical ou les visiteurs d'expositions mycologiques. Les discussions qui s'ensuivirent aboutirent rapidement à la création, sur la base du volontariat, du Comité pour les noms français des champignons (CNFC).

Tous les membres de ce groupe de travail étaient d'emblée convaincus de la nécessité pour les mycologues d'utiliser dans tous leurs rapports avec leurs divers interlocuteurs non mycologues, parallèlement à la nomenclature scientifique en latin indispensable dans tous les cas, une nomenclature française unifiée et susceptible de couvrir tous les besoins des divers utilisateurs. Constatant le caractère à la fois très fluctuant et très lacunaire de la nomenclature française existante, le CNFC a entrepris dès 1999 de la normaliser et de la compléter. C'est là, comme on peut s'en douter, une tâche gigantesque et très complexe, qui ne progresse que lentement.

Quand le CNFC a fini de traiter un ensemble (genre ou famille), il soumet ses résultats à la critique des autres mycologues par la voie du forum Inventaire-myc. Il révisé ensuite ses choix en tenant compte le mieux possible des observations formulées, puis publie la liste ainsi revue sur le site internet de la Société mycologique de France (SMF), où tout le monde peut la consulter.

Le présent document est destiné à mettre les listes déjà établies à la disposition des membres d'associations mycologiques ne disposant pas d'un accès internet, qui auront donc comme les autres la possibilité de s'en servir dans leurs relations avec le public non mycologue, par exemple dans leurs expositions locales ou lors de séances d'initiation.

Nous attirons cependant l'attention sur le caractère éminemment fragmentaire et provisoire du contenu de ce document, qui sera enrichi d'apports nouveaux au fur et à mesure de l'avancement des travaux du CNFC.

Pour toute question relative à ce document, s'adresser à :

*Société Mycologique de France
20, rue Rottembourg
75012 PARIS*

Courriel : smf@mycofrance.org

A. Liste des espèces (par nom latin)

Noms latins	Noms français retenus
<i>Abortiporus biennis</i> (Bulliard : Fr.) Singer	Polypore bisannuel
<i>Agaricus abruptibulbus</i>	voir <i>Ag. essettei</i>
<i>Agaricus aestivalis</i>	voir <i>Ag. albosericeus</i>
<i>Agaricus aestivalis</i> var. <i>veneris</i>	voir <i>Ag. heimii</i>
<i>Agaricus albertii</i>	voir <i>Ag. urinascens</i>
<i>Agaricus albosericeus</i> S. Rauschert (syn. <i>Ag. aestivalis</i>)	Agaric d'été
<i>Agaricus albosanguineus</i>	voir <i>Ag. benesii</i>
<i>Agaricus altipes</i> (F. H. Møller) Pilát	Agaric élevé
<i>Agaricus amethystinus</i>	voir <i>Ag. purpurellus</i>
<i>Agaricus annae</i> Pilát (syn. <i>Ag. silvaticus</i> var. <i>pallens</i>)	Agaric d'Anna
<i>Agaricus arvensis</i> J. C. Sch. : Fr.	Agaric des jachères OU Boule-de-neige
<i>Agaricus arvensis</i> var. <i>macrolepis</i>	voir <i>Ag. macrolepis</i>
<i>Agaricus augustus</i> Fr.	Agaric impérial
<i>Agaricus augustus</i> var. <i>albus</i> Mos.	Agaric impérial blanc
<i>Agaricus benesii</i> (Pilát) Singer (syn. <i>Ag. albosanguineus</i>)	Agaric blanc sanguinolent
<i>Agaricus bernardii</i> (Quélet.) Quélet	Agaric des prés salés
<i>Agaricus bisporus</i> (J. E. Lange) Imbach	Champignon de Paris, forme sauvage
<i>Agaricus bisporus</i> var. <i>albidus</i> (J. E. Lange) Singer	Champignon de Paris
<i>Agaricus bitorquis</i> (Quélet) Saccardo	Agaric des trottoirs
<i>Agaricus bitorquis</i> var. <i>validus</i> (F. H. Møller) Bon et Cappelli	Agaric robuste
<i>Agaricus bohusii</i> M. Bon	Agaric à pied en fuseau
<i>Agaricus boisseletii</i> Heinem.	Agaric lie-de-vin
<i>Agaricus bresadolanus</i> Bohus	Agaric des robiniers
<i>Agaricus campestris</i> L.	Agaric champêtre OU Rosé-des-prés
<i>Agaricus capellianus</i> J. Hlaváček (syn. <i>Ag. vaporarius</i>)	Agaric des bords de route
<i>Agaricus comtulus</i> Fr.	Agaric élégant
<i>Agaricus cupreobrunneus</i> (F. H. Møller) Pilát	Agaric brun cuivré
<i>Agaricus cupressicola</i> Bon et Grilli	Agaric des cyprès
<i>Agaricus depauperatus</i> (F. H. Møller) Pilát	Agaric loqueteux
<i>Agaricus devoniensis</i> P. D. Orton	Agaric des dunes
<i>Agaricus elvensis</i>	voir <i>Ag. bohusii</i>
<i>Agaricus essettei</i> Bon (syn. <i>Ag. abruptibulbus</i>)	Agaric à pied bulbeux
<i>Agaricus excellens</i> F. H. Møller	Agaric éminent
<i>Agaricus fissuratus</i> (F. H. Møller) F. H. Møller	Agaric fissuré
<i>Agaricus fuscofibrillosus</i> (F. H. Møller) Pilát	Agaric fibrilleux
<i>Agaricus geesterani</i>	voir <i>Allopsalliota geesteranii</i>
<i>Agaricus gennadii</i> (Chatin et Boud.) P. D. Orton	Agaric volvacé des cyprès
<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulzer	Agaric sanguinolent
<i>Agaricus heimii</i> Bon (syn. <i>Ag. aestivalis</i> var. <i>veneris</i>)	Agaric de printemps
<i>Agaricus hortensis</i>	voir <i>Ag. bisporus</i> var. <i>albidus</i>
<i>Agaricus huijsmanii</i> Courtecuisse (syn. <i>Ag. niveolutescens</i>)	Agaric blanc jaunissant
<i>Agaricus impudicus</i> (Rea) Pilát	Agaric impudique
<i>Agaricus infidus</i>	voir <i>Ag. romagnesii</i>
<i>Agaricus iodosmus</i> Heinem.	Agaric à odeur iodée
<i>Agaricus koelerionensis</i> Bon	Agaric de l'arrière-dune
<i>Agaricus kuehnerianus</i>	voir <i>Ag. urinascens</i> var. <i>kuehnerianus</i>
<i>Agaricus langei</i> (F. H. Møller) F. H. Møller	Agaric rougissant
<i>Agaricus lanipes</i> (F. H. Møller et J. Schäff.) Hlaváček	Agaric à pied laineux
<i>Agaricus leucotrichus</i> (F. H. Møller) F. H. Møller	Agaric à toison blanche

Noms latins	Noms français retenus
<i>Agaricus luteolorufescens</i>	voir <i>Ag. lanipes</i>
<i>Agaricus luteomaculatus</i> (F. H. Møller) F. H. Møller	Agaric taché de jaune
<i>Agaricus macrocarpus</i> (F. H. Møller) F. H. Møller	Agaric géant des bois
<i>Agaricus macrolepis</i> (Pilát & Pouzar) Boisselet et Courtecuisse	Agaric à grandes écailles
<i>Agaricus macrosporus</i>	voir <i>Ag. urinascens</i>
<i>Agaricus maleolens</i> F. H. Møller	Agaric malodorant
<i>Agaricus menieri</i> Bon	Agaric jaunissant des dunes
<i>Agaricus moelleri</i> Wasser (syn. <i>Ag. praeclaresquamosus</i>)	Agaric pintade
<i>Agaricus moellerianus</i> Bon	Agaric à pied floconneux
<i>Agaricus niveolutescens</i>	voir <i>Ag. huijsmanii</i>
<i>Agaricus nivescens</i>	voir <i>Ag. osecanus</i>
<i>Agaricus osecanus</i> Pilát (syn. <i>Ag. nivescens</i>)	Agaric neigeux
<i>Agaricus pampeanus</i> Spegazzini	Agaric de la pampa
<i>Agaricus pequinii</i> (Boudier) Konrad & Maublanc	Agaric volvacé des serres
<i>Agaricus phaeolepidotus</i> (F. H. Møller) F. H. Møller	Agaric à écailles sombres
<i>Agaricus pilatianus</i> Bohus	Agaric de Pilát
<i>Agaricus porphyron</i> P. D. Orton	Agaric porphyre
<i>Agaricus porphyrocephalus</i> F. H. Møller	Agaric pourpré
<i>Agaricus praeclaresquamosus</i>	voir <i>Ag. moelleri</i>
<i>Agaricus purpurellus</i> (F. H. Møller) F. H. Møller	Agaric améthyste
<i>Agaricus romagnesii</i> Wasser (syn. <i>Ag. infidus</i>)	Agaric radicant
<i>Agaricus semotus</i> Fr.	Agaric solitaire
<i>Agaricus silvaticus</i> J. C. Sch.	Agaric des forêts
<i>Agaricus silvaticus</i> var. <i>pallens</i>	voir <i>Ag. annae</i>
<i>Agaricus silvicola</i> (Vittad.) Peck	Agaric anisé des bois
<i>Agaricus spissicaulis</i> F. H. Møller	Agaric épais
<i>Agaricus squamulifer</i> (F. H. Møller) Pilát	Agaric squamuleux
<i>Agaricus subfloccosus</i> (J. E. Lange) Hlaváček	Agaric à flocons
<i>Agaricus subperonatus</i> (J. E. Lange) Singer	Agaric guêtré
<i>Agaricus urinascens</i> (J. Schäffer & F. H. Møller) Singer	Agaric géant des prés
<i>Agaricus urinascens</i> var. <i>kuehnerianus</i> (Heinemann) Courtecuisse	Agaric géant des Alpes
<i>Agaricus vaporarius</i>	voir <i>Ag. cappellianus</i>
<i>Agaricus variegans</i> F. H. Møller	Agaric moucheté
<i>Agaricus villaticus</i>	voir <i>Ag. urinascens</i>
<i>Agaricus xanthoderma</i> Genevier	Agaric jaunissant
<i>Agaricus xantholepis</i> (F. H. Møller) F. H. Møller	Agaric à écailles jaunes
<i>Allopsalliota geesteranii</i> (Bas & Heinemann) Nauta & Bas	Agaric vineux
<i>Alnicola amarescens</i> (Quélet) Heim & Romagnesi	Alnicole amère
<i>Alnicola badiolateritia</i> (P.D. Orton) Courtecuisse	Alnicole inondable
<i>Alnicola bohémica</i> (Velenovsky) Kühner & R. Maire	Alnicole de Bohême
<i>Alnicola cholea</i> Kühner	Alnicole de fiel
<i>Alnicola escharoides</i> (Fr. : Fr.) Romagnesi	Alnicole jaunâtre
<i>Alnicola geraniolens</i> Courtecuisse	Alnicole à odeur de géranium
<i>Alnicola inculca</i> (Peck) Singer	Alnicole farineuse
<i>Alnicola luteolofibrillosa</i> Kühner	Alnicole laineuse
<i>Alnicola macrospora</i> (J.E. Lange) J. Favre	Alnicole des saules
<i>Alnicola rubriceps</i> (P.D. Orton) Courtecuisse	Alnicole à pied blanc
<i>Alnicola scolecina</i> (Fr.) Romagnesi	Alnicole rougeâtre
<i>Alnicola tantilla</i> (J. Favre) Romagnesi	Alnicole des saules nains
<i>Alnicola umbrina</i> (R. Maire) Kühner	Alnicole commune
<i>Amanita arctica</i> Bas, T. Knudsen et Borgen	Amanite arctique
<i>Amanita asteropus</i> Romagn.	Amanite à bulbe étoilé
<i>Amanita badia</i> (Schæff.) Bon et Contu	Amanite baie
<i>Amanita battarrae</i> (Boud.) Bon (syn. <i>Am. umbrinolutea</i> s. auct.)	Amanite à cocarde

Noms latins	Noms français retenus
<i>Amanita beckeri</i> Huijsman	Amanite noisette
<i>Amanita beillei</i>	voir <i>A. boudieri</i> var. <i>beillei</i>
<i>Amanita boudieri</i> Barla (syn. <i>Am. baccata</i> (Fr.) Gillet)	Amanite toupie
<i>Amanita boudieri</i> var. <i>beillei</i> (Beauseigneur) Kühner & Romagnesi ex Neville & Poumarat	Amanite à lames saumon
<i>Amanita caesarea</i> (Scop. : Fr.) Pers.	Amanite des Césars / Oronge
<i>Amanita ceciliae</i> (Berk. et Broome) Boudier (syn. <i>Am. inaurata</i> Gillet, <i>strangulata</i> (Fr.) Saccardo)	Amanite impériale
<i>Amanita citrina</i> (J.C. Sch.) Pers.	Amanite citrine
<i>Amanita citrina</i> f. <i>alba</i> (Price) Quélet	Amanite citrine blanche
<i>Amanita codinae</i> (R. Maire) Bertault	Amanite de Codina
<i>Amanita crocea</i> (Quélet) Singer	Amanite safran
<i>Amanita curtipes</i> E. J. Gilbert	Amanite à pied court
<i>Amanita decipiens</i> (Trimbach) Jacquetant	Amanite trompeuse
<i>Amanita dunensis</i> (Heim) ex M. Bon & Andary	Amanite des dunes
<i>Amanita echinocephala</i> (Vittadini) Quélet (syn. <i>Am. solitaria</i>)	Amanite épineuse
<i>Amanita eliae</i> Quélet	Amanite isabelle
<i>Amanita excelsa</i> (Fr. : Fr.) Bertillon (syn. <i>Am. ampla</i> Pers. : Fr.)	Amanite élevée
<i>Amanita excelsa</i> var. <i>spissa</i> (Fr.) Neville & Poumarat	Amanite épaisse
<i>Amanita franchetii</i> (Boudier) Fayod	Amanite à voile jaune
<i>Amanita friabilis</i> (P. Karsten) Bas	Amanite des aulnes
<i>Amanita fulva</i> (J.C. Sch. ?) Fr.	Amanite fauve
<i>Amanita gilbertii</i> Beauseign.	Amanite plantoir
<i>Amanita gracilior</i> Bas et Honrubia	Amanite gracile
<i>Amanita heterochroma</i> Curreli	Amanite des eucalyptus
<i>Amanita jonquillea</i> Quélet (syn. <i>Am. gemmata</i> (Paulet) Bertillon)	Amanite jonquille
<i>Amanita lactea</i> Malençon, Romagnesi & Reid	Amanite blanc de lait
<i>Amanita lepiotoides</i> Barla	Amanite fausse-lépiote
<i>Amanita lividopallescens</i> (Secrétan ex Gillet) Bigeard & Guillemin	Amanite livide
<i>Amanita lividopallescens</i> var. <i>tigrina</i> Romagnesi ex M. Bon	Amanite tigrée
<i>Amanita mairei</i> Foley (syn. <i>Am. argentea</i>)	Amanite argentée
<i>Amanita malleata</i> (Piane ex M. Bon) Contu	Amanite martelée
<i>Amanita muscaria</i> (L. : Fr.) Lamarck	Amanite tue-mouches / Fausse oronge
<i>Amanita muscaria</i> var. <i>aureola</i> (Kalchbrenner) Quélet	Amanite tue-mouches dorée
<i>Amanita nivalis</i> (Greville) Saccardo	Amanite des neiges
<i>Amanita oreina</i> (J. Favre) Heim ex M. Bon	Amanite des montagnes
<i>Amanita ovoidea</i> (Bull. : Fr.) Link	Amanite ovoïde
<i>Amanita pachyvolvata</i> (M. Bon) G.J. Krieglsteiner	Amanite à volve épaisse
<i>Amanita pantherina</i> (de Candolle : Fr.) Krombholz	Amanite panthère
<i>Amanita phalloides</i> (Fr. : Fr.) Link	Amanite phalloïde
<i>Amanita phalloides</i> var. <i>alba</i> Costantin & Dufour	Amanite phalloïde blanche
<i>Amanita ponderosa</i> Malençon & Heim	Amanite compacte
<i>Amanita ponderosa</i> f. <i>valens</i> (E.-J. Gilbert) Neville & Poumarat	Amanite robuste
<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schw. : Fr.	Amanite porphyre
<i>Amanita proxima</i> Dumée	Amanite à volve rousse
<i>Amanita pseudoregalis</i> Pluvinage	Amanite fausse-royale
<i>Amanita rubescens</i> (Pers. : Fr.) Pers.	Amanite rougissante / Golmotte
<i>Amanita singeri</i> Bas	Amanite des prairies
<i>Amanita spissa</i>	voir <i>A. excelsa</i> var. <i>spissa</i>
<i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet ex Vittadini) Bertillon	Amanite solitaire
<i>Amanita submembranacea</i> (M. Bon) Gröger	Amanite à volve grise
<i>Amanita vaginata</i> (Bull. : Fr.) Vittadini	Amanite vaginée / Grisette

Noms latins	Noms français retenus
<i>Amanita valens</i> (E. J. Gilbert) Bertault	voir <i>A. ponderosa</i> f. <i>valens</i>
<i>Amanita verna</i> (Bull. : Fr.) Lamarck	Amanite printanière
<i>Amanita virosa</i> Lamarck	Amanite vireuse
<i>Amanita vittadini</i> (Moretti) Vitt.	Amanite de Vittadini
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	Clitocybe à pied en massue
<i>Antrodia albida</i> (Fr. : Fr.) Donk	Polypore blanchâtre
<i>Antrodiella hoehnelii</i>	voir <i>Antrodiella serpula</i>
<i>Antrodiella serpula</i> (P. Karsten) Spirin & Niemelä	Polypore vorace
<i>Armillaria borealis</i> Marxmüller & Korhonen	Armillaire boréale
<i>Armillaria cepistipes</i> Velenovsky	Armillaire pied-bot
<i>Armillaria ectypa</i> (Fr. : Fr.) Emel	Armillaire des tourbières
<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	Armillaire à voile jaune
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl. : Fr.) Kummer	Armillaire couleur de miel
<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagnesi) Herink	Armillaire obscure
<i>Armillaria socialis</i> (de Candolle : Fr.) Herink	Armillaire sans anneau
<i>Armillaria tabescens</i>	voir <i>Armillaria socialis</i>
<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quélet) Pouzar	Bolet cramoisi
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull. : Fr.) Wettstein	Oreille de Judas
<i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks. : Fr.) Pers.	Oreille poilue
<i>Baeospora myosura</i> (Fr. : Fr.) Singer	Collybie queue de souris
<i>Bjerkandera adusta</i> (Willdenow : Fr.) P. Karsten	Tramète brûlée
<i>Bjerkandera fumosa</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten	Tramète enfumée
<i>Bolbitius reticulatus</i> (Pers. : Fr.) Ricken	Bolbitie réticulée
<i>Bolbitius tener</i> Berk. & Br.	Bolbitie délicate
<i>Bolbitius titubans</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Bolbitie jaune d'œuf
<i>Bolbitius variicolor</i> G.F. Atkinson	Bolbitie olivacée
<i>Boletinus cavipes</i> (Opatowski) Kalchbrenner	Bolet à pied creux
<i>Boletus aemilii</i> Barbier	Bolet délaissé.
<i>Boletus aereus</i> Bull. : Fr.	Cèpe bronzé / Tête-de-nègre
<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr. (syn. <i>B. reticulatus</i>)	Cèpe d'été
<i>Boletus albidus</i>	voir <i>Boletus radicans</i>
<i>Boletus appendiculatus</i> J.C. Sch. : Fr.	Bolet appendiculé
<i>Boletus betulicola</i>	voir <i>Boletus edulis</i> f. <i>betulicola</i>
<i>Boletus calopus</i> Pers. : Fr.	Bolet à beau pied
<i>Boletus depilatus</i> Redeuilh	Bolet chauve
<i>Boletus dupainii</i> Boudier	Bolet de Dupain
<i>Boletus edulis</i> Bull. : Fr.	Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus edulis</i> f. <i>betulicola</i> Vassilkov	Cèpe des bouleaux
<i>Boletus edulis</i> var. <i>albus</i> (Pers.) E.-J. Gilbert	Cèpe blanc
<i>Boletus edulis</i> var. <i>citrinus</i> (Venturi ?) E.-J. Gilbert	Cèpe citron
<i>Boletus erythropus</i> Pers. : Fr.	Bolet à pied rouge
<i>Boletus erythropus</i> var. <i>junquilleus</i> (Quélet) M. Bon	Bolet jonquille
<i>Boletus fechtneri</i> Velenovsky	Bolet pâle
<i>Boletus fragrans</i> Vittadini	Bolet odorant
<i>Boletus impolitus</i> Fr.	Bolet dépoli
<i>Boletus junquilleus</i>	voir <i>Boletus erythropus</i> var. <i>junquilleus</i>
<i>Boletus legaliae</i> (Pilát) ex Pilát & Dermek (syn. <i>B. satanoides</i> pp.)	Bolet chicorée
<i>Boletus leonis</i>	voir <i>Xerocomus leonis</i>
<i>Boletus lupinus</i> Fr.	Bolet de loup
<i>Boletus luridus</i> J.C. Sch. : Fr.	Bolet blafard
<i>Boletus luteocupreus</i> Bertéa et Estades	Bolet cuivré
<i>Boletus mamorensis</i> Redeuilh	Cèpe de la Mâmora
<i>Boletus pallescens</i>	voir <i>Boletus fechtneri</i>

Noms latins	Noms français retenus
<i>Boletus permagnificus</i> Pöder	Bolet magnifique
<i>Boletus persoonii</i> Bon	voir <i>Boletus edulis</i> var. <i>albus</i>
<i>Boletus pinophilus</i> Pilát et Dermek	Cèpe des pins
<i>Boletus poikilochromus</i> Pöder, Cetto et Zuccher.	Bolet polychrome
<i>Boletus pseudoregius</i> (Hubert) ex Estades	Bolet faux royal
<i>Boletus pulchrotinctus</i> Alessio	Bolet joli
<i>Boletus pulverulentus</i> Opatowski	Bolet pulvérulent
<i>Boletus queletii</i> Schulzer von Muggenburg	Bolet de Quélet
<i>Boletus radicans</i> Pers. : Fr. (syn. <i>B. albidus</i>)	Bolet radçant
<i>Boletus regius</i> Krombholz	Bolet royal
<i>Boletus reticulatus</i>	voir <i>Boletus aestivalis</i>
<i>Boletus rhodopurpureus</i> Smotlacha	Bolet vieux rose
<i>Boletus rhodoxanthus</i> (Krombholz) Kallenbach	Bolet rouge et jaune
<i>Boletus rubrosanguineus</i> (Walty) ex Cheype	Bolet rouge sang
<i>Boletus satanas</i> Lenz	Bolet Satan
<i>Boletus satanoides</i> (pro parte)	voir <i>Boletus legaliae</i>
<i>Boletus spretus</i>	voir <i>Boletus aemilii</i>
<i>Boletus subappendiculatus</i> Dermek, Lazebnicek & Veselský	Bolet des sapins
<i>Boletus torosus</i> Fr.	Bolet de plomb
<i>Boletus venturii</i>	voir <i>Boletus edulis</i> var. <i>citrinus</i>
<i>Boletus xanthocyaneus</i> (Ramain) ex Romagnesi	Bolet jaune et bleu
<i>Bondarzewia mesenterica</i> (J.C. Sch.) Kreisel	Polypore des montagnes
<i>Buchwaldoboletus lignicola</i> (Kallenbach) Pilát (syn. <i>Pulveroboletus lignicola</i>)	Bolet lignicole
<i>Callistosporium xanthophyllum</i> (Malençon & Bertault) ex M. Bon	Collybie à lames jaunes
<i>Calocera cornea</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Calocère petite-corne
<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Calocère visqueuse
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr. : Fr.) Donk	Tricholome de la Saint-Georges
<i>Cantharellula umbonata</i> (J.F. Gmel. : Fr.) Singer	Fausse-chanterelle des bruyères
<i>Cantharellus amethysteus</i> (Quélet) Saccardo	Girolle améthyste
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. : Fr.	Girolle
<i>Cantharellus ferruginascens</i> P. D. Orton	Girolle ferrugineuse
<i>Cantharellus friesii</i> Quélet	Girolle abricot
<i>Cantharellus ianthinoxanthus</i>	voir <i>Craterellus ianthinoxanthus</i>
<i>Cantharellus lilacinopruinatus</i> Hermitte, Eyssartier & Poumarat	Girolle du Midi
<i>Cantharellus lutescens</i>	voir <i>Craterellus lutescens</i>
<i>Cantharellus melanoxeros</i>	voir <i>Craterellus melanoxeros</i>
<i>Cantharellus sinuosus</i>	voir <i>Craterellus sinuosus</i>
<i>Cantharellus subpruinus</i> Eyssartier & Buyck	Girolle pruineuse
<i>Cantharellus tubaeformis</i>	voir <i>Craterellus tubaeformis</i>
<i>Catathelasma imperiale</i> (Fr. → Quélet) Singer	Armillaire impériale
<i>Cerrena unicolor</i> (Bull. : Fr.) Murrill	Tramète à ligne noire
<i>Chalciporus amarellus</i> (Quélet) Bataille	Bolet nain
<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull. : Fr.) Bataille	Bolet poivré
<i>Chalciporus rubinus</i> (W.G. Smith) Singer	Bolet rubis
<i>Clathrus archeri</i> (Berk.) Dring	Anthurus étoilé
<i>Clathrus ruber</i> [Micheli] : Pers.	Clathre rouge
<i>Clavaria acuta</i> Sow. : Fr.	Clavaire aiguë
<i>Clavaria aestivalis</i> Romagnesi	Clavaire d'été
<i>Clavaria argillacea</i> Pers. : Fr.	Clavaire argilacée
<i>Clavaria argillacea</i> var. <i>sphagnicola</i> (Boudier) Corner	Clavaire des sphaignes
<i>Clavaria corbierei</i> Bourdot & Galzin	Clavaire de la Manche
<i>Clavaria daulnoyae</i> Quélet	Clavaire de Daulnoy
<i>Clavaria fragilis</i> Holmskjöld : Fr.	Clavaire vermicelle
<i>Clavaria fumosa</i> Pers. : Fr.	Clavaire fuligineuse

Noms latins	Noms français retenus
<i>Clavaria greletii</i> Boudier	Clavaire gris-bleu
<i>Clavaria incarnata</i> Weinmann	Clavaire saumonée
<i>Clavaria rosea</i> Dalman : Fr.	Clavaire rose
<i>Clavaria straminea</i> Cotton	Clavaire jaune paille
<i>Clavaria tenuipes</i> Berk. & Br.	Clavaire à pied fin
<i>Clavaria zollingeri</i> Léveillé	Clavaire violette
<i>Clavariadelphus ligula</i> (J.C. Sch. : Fr.) Donk	Clavaire petite langue
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L. : Fr.) Donk	Clavaire en pilon
<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quélet) Donk	Clavaire tronquée
<i>Clavicornia pyxidata</i> (Pers. : Fr.) Doty	Clavaire en chandelier
<i>Clavicornia taxophila</i> (Thom) Doty	Clavaire petite massue
<i>Clavulina cinerea</i> (Bull. : Fr.) J. Schröter	Clavaire cendrée
<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) J. Schröter	Clavaire crêtée
<i>Clavulina rugosa</i> (Bull. : Fr.) J. Schröter	Clavaire rugueuse
<i>Clavulinopsis corniculata</i> (J.C. Sch. : Fr.) Corner	Clavaire cornue
<i>Clavulinopsis dichotoma</i> (Godey) Corner	Clavaire bifide
<i>Clavulinopsis fusiformis</i> (Sow. : Fr.) Corner	Clavaire en fuseau
<i>Clavulinopsis helvola</i> (Pers. : Fr.) Corner	Clavaire lumineuse
<i>Clavulinopsis laeticolor</i> (Berk. & Br.) R.H. Petersen	Clavaire joyeuse
<i>Clavulinopsis luteoalba</i> (Rea) Corner	Clavaire jaune pâle
<i>Clavulinopsis luteoochracea</i> (Cavara) Corner	Clavaire ocre jaune
<i>Clavulinopsis umbrinella</i> (Saccardo) Corner	Clavaire obscurcie
<i>Climacocystis borealis</i> (Fr. : Fr.) Kotlaba et Pouzar	Polypore boréal
<i>Clitocybe absinthiata</i>	voir <i>Pseudoomphalina absinthiata</i>
<i>Clitocybe alexandri</i> (Gillet) Gillet	Clitocybe plombé
<i>Clitocybe amoenolens</i> Malençon	Clitocybe à bonne odeur
<i>Clitocybe bresadolana</i> Singer ex M. Bon	Clitocybe de Bresadola
<i>Clitocybe brumalis</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Clitocybe hivernal
<i>Clitocybe candicans</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Clitocybe blanchissant
<i>Clitocybe cerussata</i> (Fr. : Fr.) Kummer (syn. <i>C. pithyophila</i>)	Clitocybe cérusé
<i>Clitocybe clavipes</i>	voir <i>Ampulloclitocybe clavipes</i>
<i>Clitocybe costata</i> Kühner & Romagnesi ex Kühner & Romagnesi	Clitocybe côtélé
<i>Clitocybe dealbata</i> (Sow. : Fr.) Kummer	Clitocybe blanchi
<i>Clitocybe decembris</i> Singer	Clitocybe bicolore
<i>Clitocybe deceptiva</i>	voir <i>Clitocybe suaveolens</i>
<i>Clitocybe diatreta</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Clitocybe rosé
<i>Clitocybe ditopa</i> (Fr. : Fr.) Gillet	Clitocybe farineux
<i>Clitocybe foetens</i> Melot	Clitocybe fétide
<i>Clitocybe font-queri</i> Heim	Clitocybe petite souris
<i>Clitocybe fragrans</i> (With. : Fr.) Kummer	Clitocybe anisé strié
<i>Clitocybe geotropa</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Clitocybe géotrope
<i>Clitocybe gibba</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Clitocybe en entonnoir
<i>Clitocybe graminicola</i> M. Bon	Clitocybe des pelouses
<i>Clitocybe houghtonii</i> (W. Phillips) Dennis	Clitocybe feuille de tomate
<i>Clitocybe inornata</i> (Sow. : Fr.) Gillet	Clitocybe à odeur de poisson
<i>Clitocybe lituus</i> (Fr.) Métrod	Clitocybe en trompette
<i>Clitocybe metachroa</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Clitocybe à centre brun
<i>Clitocybe nitriolens</i> J. Favre	Clitocybe nitreux
<i>Clitocybe obsoleta</i> (Batsch : Fr.) Quélet	Clitocybe anisé rosâtre
<i>Clitocybe odora</i> (Bull. : Fr.) Kummer	Clitocybe odorant
<i>Clitocybe odora</i> f. <i>alba</i> J.E. Lange	Clitocybe odorant blanc
<i>Clitocybe ornamentalis</i>	voir <i>Clitocybe phyllophila</i> var. <i>ornamentalis</i>
<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Clitocybe à odeur de poulailler

Noms latins	Noms français retenus
<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Clitocybe des feuilles
<i>Clitocybe phyllophila</i> var. <i>ornamentalis</i> (Velenovsky) Raitelhuber	Clitocybe anisé des feuilles
<i>Clitocybe pithyophila</i>	voir <i>Clitocybe cerussata</i>
<i>Clitocybe pruinosa</i> (Lasch) Kummer	Clitocybe de mars
<i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Clitocybe du bord des routes
<i>Clitocybe sinopica</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Clitocybe terre cuite
<i>Clitocybe squamulosa</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Clitocybe squamuleux
<i>Clitocybe squamulosoides</i> P.D. Orton	Clitocybe faux-squamuleux
<i>Clitocybe suaveolens</i> (Schum. : Fr.) Kummer	Clitocybe anisé pâle
<i>Clitocybe subspadicea</i>	voir <i>Gerronema subspadiceum</i>
<i>Clitocybe umbilicata</i> (J.C. Sch. ?) Kummer	Clitocybe ombiliqué
<i>Clitocybe vermicularis</i> (Fr.) Kummer	Clitocybe à rhizomorphes
<i>Clitocybe vibecina</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Clitocybe moisi
<i>Clitocybula lacerata</i> (Scop.) Métrod ex Singer	Collybie lacérée
<i>Clitopilus cystidiatus</i> Hausknecht & Noordeloos	Meunier gris
<i>Clitopilus hobsonii</i> (Berk.) P.D. Orton	Clitopile sessile
<i>Clitopilus omphaliformis</i> Josserand	Clitopile omphale
<i>Clitopilus passekerianus</i> (Pilát) Singer [<i>inval.</i>]	Clitopile du fumier
<i>Clitopilus pinsitus</i> (Fr. : Fr.) Josserand	Clitopile aplati
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop. : Fr.) Kummer	Meunier
<i>Clitopilus scyphoides</i> (Fr. : Fr.) Singer	Clitopile gobelet
<i>Collybia aquosa</i> (Bull. : Fr.) Kummer	Collybie aqueuse
<i>Collybia butyracea</i> (Bull. : Fr.) Kummer	Collybie beurrée
<i>Collybia cirrhata</i>	voir <i>Microcollybia cirrhata</i>
<i>Collybia confluens</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Collybie en touffes
<i>Collybia cookei</i>	voir <i>Microcollybia cookei</i>
<i>Collybia distorta</i>	voir <i>Collybia proluxa</i> var. <i>distorta</i>
<i>Collybia dryophila</i> (Bull. : Fr.) Kummer	Collybie des chênes
<i>Collybia erythropus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Collybie à pied rouge
<i>Collybia fagiphila</i> Velenovsky	Collybie des hêtres
<i>Collybia filamentosa</i> Velenovsky	Collybie peignée
<i>Collybia fodiens</i> (Kalchbrenner) Konrad & Maublanc	Collybie fouisseuse
<i>Collybia fuscopurpurea</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Collybie pourprée
<i>Collybia fusipes</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Collybie à pied en fuseau
<i>Collybia hybrida</i> (Kühner & Romagnesi) Svrcek & Kubicka	Collybie hybride
<i>Collybia impudica</i> (Fr.) Singer	Collybie fétide
<i>Collybia kuehneriana</i>	voir <i>Collybia erythropus</i>
<i>Collybia maculata</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer	Collybie maculée
<i>Collybia ocior</i> (Pers.) Vilgalys et O. K. Miller	Collybie ambrée
<i>Collybia peronata</i> (Bolt. : Fr.) Kummer	Collybie guêtrée
<i>Collybia proluxa</i> var. <i>distorta</i> (Fr.) P. Roux	Collybie à pied tordu
<i>Collybia racemosa</i>	voir <i>Dendrocollybia racemosa</i>
<i>Collybia tuberosa</i>	voir <i>Microcollybia tuberosa</i>
<i>Collybia verna</i> Ryman	Collybie des neiges
<i>Coltricia cinnamomea</i> (Jacq.) Murrill	Polypore cannelle
<i>Coltricia perennis</i> (L. : Fr.) S.F. Gray	Polypore vivace
<i>Colus hirudinosus</i> Cavalier & Séchier	Clathre à colonnes
<i>Conocybe antipus</i> (Lasch : Fr.) Fayod	Conocybe radicaire
<i>Conocybe apala</i> (Fr. : Fr.) Arnolds	Conocybe à pied blanc
<i>Conocybe brunneola</i> (Kühner) ex Kühner & Watling	Conocybe brunâtre
<i>Conocybe conocephala</i> (Bull. : Fr.) M. Bon	Conocybe doigt de gant
<i>Conocybe dunensis</i> T.J. Wallace	Conocybe des dunes
<i>Conocybe inocybeoides</i> Watling	Conocybe bulbeux
<i>Conocybe tenera</i> (J.C. Sch. : Fr.) Fayod	Conocybe commun

Noms latins	Noms français retenus
<i>Coprinus acuminatus</i> (Romagnesi) P.D. Orton	Coprin noir d'encre pointu
<i>Coprinus alopecia</i>	voir <i>Coprinus insignis</i>
<i>Coprinus ammophilae</i> Courtecuisse	Coprin des oyats
<i>Coprinus angulatus</i> Peck (syn. <i>C. boudieri</i>)	Coprin des charbonnières
<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Coprin noir d'encre
<i>Coprinus auricomus</i> Patouillard	Coprin doré
<i>Coprinus boudieri</i>	voir <i>Coprinus angulatus</i>
<i>Coprinus cinereus</i> (J.C. Sch. : Fr.) S.F. Gray	Coprin cendré
<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müller : Fr.)	Coprin chevelu
<i>Coprinus disseminatus</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray	Coprin grégaire
<i>Coprinus domesticus</i> (Bolt. : Fr.) S.F. Gray	Coprin domestique
<i>Coprinus ellisii</i> P.D. Orton	Coprin à fausse volve
<i>Coprinus erythrocephalus</i> (Léveillé) Fr.	Coprin à tête rouge
<i>Coprinus friesii</i> Quélet	Coprin des chaumes
<i>Coprinus gonophyllus</i> Quélet	Coprin mini-pie
<i>Coprinus impatiens</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Coprin impatient
<i>Coprinus insignis</i> Peck	Coprin chauve
<i>Coprinus laanii</i> Kits van Waveren	Coprin gris souris
<i>Coprinus lagopides</i>	voir <i>Coprinus phlyctidosporus</i>
<i>Coprinus lagopus</i> (Fr.:Fr.) Fr.	Coprin pied-de-lièvre
<i>Coprinus leiocephalus</i> P.D. Orton	Coprin glabre
<i>Coprinus martinii</i> J. Favre ex P.D. Orton	Coprin des joncs
<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.) Fr.	Coprin micacé
<i>Coprinus miser</i> P. Karsten	Coprin misérable
<i>Coprinus narcoticus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Coprin à odeur de bitume
<i>Coprinus niveus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Coprin blanc de neige
<i>Coprinus phlyctidosporus</i> Romagnesi	Coprin laineux des charbonnières
<i>Coprinus picaceus</i> (Bull. : Fr.) S.F. Gray	Coprin pie
<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.) Fr.	Coprin parasol
<i>Coprinus populicola</i>	voir <i>Coprinus strossmayeri</i>
<i>Coprinus radians</i> (Desmazières : Fr.) Fr.	Coprin à feutre roux
<i>Coprinus romagnesianus</i> Singer	Coprin squamuleux
<i>Coprinus sterquilinus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Coprin annelé
<i>Coprinus strossmayeri</i> Schulzer von Muggenburg	Coprin du peuplier
<i>Coprinus truncorum</i> (J.C. Sch.) Fr.	Coprin micacé à pied lisse
<i>Coprinus xanthothrix</i> Romagnesi	Coprin à voile jaune
<i>Craterellus cinereus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Chanterelle cendrée
<i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers.	Trompette-de-la-mort / des morts
<i>Craterellus ianthinoxanthus</i> (R. Maire) Pérez-de-Gregorio	Chanterelle jaune et violette
<i>Craterellus konradii</i> Bourdot & R. Maire	Trompette jaune
<i>Craterellus lutescens</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Chanterelle jaune
<i>Craterellus melanoxeros</i> (Desmazières : Fr.) Pérez-de-Gregorio	Chanterelle noircissante
<i>Craterellus sinuosus</i> (Fr. : Fr.) Fr. (syn. <i>Cr. undulatus</i>)	Chanterelle sinueuse
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Chanterelle en tube
<i>Craterellus undulatus</i>	voir <i>Craterellus sinuosus</i>
<i>Daedalea quercina</i> (L. : Fr.) Pers.	Lenzite du chêne
<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolt. : Fr.) J. Schröter	Tramète rougissante
<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i>	voir <i>Daedaleopsis tricolor</i>
<i>Daedaleopsis septentrionalis</i> (P. Karsten) Niemelä	Lenzite septentrionale
<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer	Lenzite tricolore
<i>Datronia mollis</i> (Sommerfelt : Fr.) Donk	Tramète à odeur d'abricot
<i>Dendrocollybia racemosa</i> (Pers. : Fr.) R.H. Petersen & S. A. Redhead	Collybie rameuse
<i>Dendropolyporus umbellatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Polypore en ombelle

Noms latins	Noms français retenus
<i>Dermoloma atrocinerum</i> (Pers.) P.D. Orton	Tricholome gris sombre
<i>Dermoloma cuneifolium</i> (Fr. : Fr.) M. Bon	Tricholome à lames triangulaires
<i>Dermoloma pseudocuneifolium</i> M. Bon	Tricholome des pelouses
<i>Dichomitus campestris</i> (Quélet) Domanski et Orlicz	Polypore champêtre
<i>Faerberia carbonaria</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Pouzar	Fausse-chanterelle des charbonnières
<i>Fistulina hepatica</i> (J.C. Sch. : Fr.) Withering	Langue de boeuf
<i>Flammulina velutipes</i> (Curt. : Fr.) P. Karsten	Collybie à pied velouté
<i>Floccularia straminea</i> (Krombholz Kummer) Pouzar	Tricholome jaune-vert
<i>Fomes fomentarius</i> (L. : Fr.) Fr.	Amadouvier
<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) P. Karsten	Polypore marginé
<i>Fomitopsis rosea</i> (Alb. & Schw. : Fr.) P. Karsten	Polypore rose
<i>Fomitopsis spraguei</i> (Berk. & Curt.) Gilbertson & Ryvarden	Polypore du châtaignier
<i>Funalia gallica</i> (Fr. : Fr.) Bondarzew & Singer	Tramète des Gaules
<i>Funalia trogii</i> (Berk.) Bondarzew & Singer	Tramète du peuplier
<i>Ganoderma adspersum</i>	voir <i>Ganoderma australe</i>
<i>Ganoderma australe</i> (Fr. : Fr.) Patouillard	Ganoderme épaissi
<i>Ganoderma carnosum</i> Patouillard	Ganoderme du sapin
<i>Ganoderma lipsiense</i> (Batsch) G.F. Atkinson	Ganoderme plat
<i>Ganoderma lucidum</i> (W. Curtis : Fr.) P. Karsten	Ganoderme luisant
<i>Ganoderma pfeifferi</i> Bresadola	Ganoderme crevasse
<i>Ganoderma resinaceum</i> Boudier	Ganoderme résineux
<i>Ganoderma valesiacum</i> Boudier	Ganoderme du mélèze
<i>Gerhardtia borealis</i> (Fr.) Contu & A. Ortega	Tricholome brun-rose
<i>Gerhardtia piperata</i> (A.H. Smith) M. Bon	Tricholome poivré
<i>Gerronema subspadiceum</i> (J.E. Lange) M. Bon	Clitocybe à ceinture blanche
<i>Gloeophyllum abietinum</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	Lenzite du sapin
<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen : Fr.) Imazeki	Polypore anisé
<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen : Fr.) P. Karsten	Lenzite des clôtures
<i>Gloeophyllum trabeum</i> (Pers. : Fr.) Murrill	Lenzite des poutres
<i>Gloeoporus dichrous</i> (Fr. : Fr.) Bresadola	Tramète bicolore
<i>Gomphus clavatus</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray	Chanterelle violette
<i>Grifola frondosa</i> (Dicks. : Fr.) S.F. Gray	Polypore en touffes
<i>Gyrodon lividus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	Bolet livide
<i>Gyroporus ammophilus</i> (M.L. Castro & Freire) M.L. Castro & Freire	Bolet des sables
<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Bolet châtain
<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Bolet indigotier
<i>Hapalopilus croceus</i> (Pers. : Fr.) Bondartzew & Singer	Polypore safran
<i>Hapalopilus rutilans</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten	Polypore rutilant
<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr. : Fr.) Brefeld	Polypore du rond des pins
<i>Hexagonia nitida</i> Durieu & Montagne	Polypore nid d'abeilles
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen : Fr.) R. Maire	Fausse-girolle
<i>Hygrophoropsis fuscusquamula</i> P. D. Orton	Fausse-girolle mouchetée
<i>Inonotus cuticularis</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	Polypore peigné
<i>Inonotus dryadeus</i> (Pers. : Fr.) Murrill	Polypore larmoyant
<i>Inonotus hispidus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	Polypore hérissé
<i>Inonotus nodulosus</i> (Fr.) Pilát	Polypore du hêtre
<i>Inonotus obliquus</i> (Pers. : Fr.) Pilát	Polypore incrusté
<i>Inonotus radiatus</i> (Sow. : Fr.) P. Karsten	Polypore de l'aulne
<i>Inonotus rheades</i> (Pers.) P. Karsten	Polypore roux
<i>Inonotus tamaricis</i> (Patouillard) R. Maire	Polypore du tamaris
<i>Inonotus tomentosus</i> (Fr. : Fr.) Teng	Polypore tomenteux

Noms latins	Noms français retenus
<i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wahlenberg : Fr.) P. Karsten	Polypore balsamique
<i>Ischnoderma resinosum</i> (Schrad. : Fr.) P. Karsten	Polypore résineux
<i>Ischnoderma trogii</i>	voir <i>Podofomes trogii</i>
<i>Lactarius acerrimus</i> Britzelmayr	Lactaire à lames interveinées
<i>Lactarius acris</i> (Bolt. : Fr.) S.F. Gray	Lactaire âcre
<i>Lactarius albocarneus</i> Britzelmayr	Lactaire glutineux
<i>Lactarius alpinus</i> Peck	Lactaire des aulnes verts
<i>Lactarius aquizonatus</i> Kytövuori	Lactaire citron pâle
<i>Lactarius aspideus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire des saules
<i>Lactarius atlanticus</i> M. Bon	Lactaire des chênes verts
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray	Lactaire orangé
<i>Lactarius aurantiofulvus</i> Blum ex M. Bon	Lactaire fauve orangé
<i>Lactarius azonites</i> (Bull.) Fr.	Lactaire à pied blanc
<i>Lactarius badiosanguineus</i> Kühner et Romagnesi	Lactaire rouge sombre
<i>Lactarius bertillonii</i> (Neuhoff ex Z. Schaefer) M. Bon	Lactaire fruité
<i>Lactarius blennius</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire muqueux
<i>Lactarius bresadolanus</i>	voir <i>Lactarius zonarioides</i>
<i>Lactarius britannicus</i> D.A. Reid	Lactaire soyeux
<i>Lactarius brunneohepaticus</i> Moser	Lactaire hépatique des aulnes verts
<i>Lactarius camphoratus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Lactaire à odeur de chicorée
<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant
<i>Lactarius circellatus</i> Fr.	Lactaire cerclé
<i>Lactarius cistophilus</i> M. Bon & Trimbach	Lactaire des cistes
<i>Lactarius citriolens</i> Pouzar	Lactaire à odeur de citron
<i>Lactarius controversus</i> Pers. : Fr.	Lactaire des peupliers
<i>Lactarius cremor</i> Fr.	Lactaire cannelé
<i>Lactarius cyathuliformis</i> M. Bon	Lactaire petite coupe
<i>Lactarius decipiens</i> Quélet	Lactaire trompeur
<i>Lactarius deliciosus</i> (L. : Fr.) S.F. Gray	Lactaire délicieux
<i>Lactarius deterrimus</i> Gröger	Lactaire des épicéas
<i>Lactarius dryadophilus</i> Kühner	Lactaire des dryades
<i>Lactarius evosmus</i> Kühner et Romagnesi	Lactaire à odeur de pomme
<i>Lactarius flavidus</i> Boudier	Lactaire jaunâtre
<i>Lactarius flexuosus</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray	Lactaire flexueux
<i>Lactarius flexuosus</i> var. <i>roseozonatus</i> von Post	Lactaire zoné de rose
<i>Lactarius fluens</i> Boudier	Lactaire pisse-lait
<i>Lactarius fuliginosus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire fuligineux
<i>Lactarius fulvissimus</i> Romagnesi	Lactaire fauve
<i>Lactarius fuscus</i> Rolland	Lactaire brun
<i>Lactarius glaucescens</i> Crossland	Lactaire verdissant
<i>Lactarius glyciosmus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire à odeur de noix de coco
<i>Lactarius helvus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire à odeur de céleri
<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright	Lactaire hépatique
<i>Lactarius hysginus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire cireux
<i>Lactarius ilicis</i> Sarnari	Lactaire livide
<i>Lactarius intermedius</i> (Fr.->) Cooke	Lactaire des sapins
<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des borbiers
<i>Lactarius lepidotus</i> Hesler & A.H. Smith	Lactaire gris des aulnes verts
<i>Lactarius lignyotus</i> Fr.	Lactaire velours
<i>Lactarius lilacinus</i> (Lasch : Fr.) Fr.	Lactaire lilacin
<i>Lactarius luridus</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray	Lactaire blafard
<i>Lactarius luteolus</i> Peck	Lactaire salissant
<i>Lactarius mairei</i> Malençon	Lactaire à poil ras

Noms latins	Noms français retenus
<i>Lactarius mediterraneensis</i> Llistosella & Bellù	Lactaire méridional
<i>Lactarius mitissimus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire très doux
<i>Lactarius musteus</i> Fr.	Lactaire pâle des tourbières
<i>Lactarius nanus</i> J. Favre	Lactaire nain
<i>Lactarius necator</i> (Bull. : Fr.) Pers.	Lactaire plombé
<i>Lactarius obscuratus</i> (Lasch : Fr.) Fr.	Lactaire olivâtre
<i>Lactarius oedehyphosus</i> Izderda & Noordeloos	Lactaire des tourbières
<i>Lactarius omphaliformis</i> Romagnesi	Lactaire ombiliqué
<i>Lactarius pallidus</i> Pers. : Fr.	Lactaire pâle
<i>Lactarius pergamenus</i> (Swartz : Fr.) Fr.	Lactaire parcheminé
<i>Lactarius picinus</i> Fr.	Lactaire enfumé
<i>Lactarius piperatus</i> (L. : Fr.) Pers.	Lactaire poivré
<i>Lactarius porninsis</i> Rolland	Lactaire des mélèzes
<i>Lactarius pterosporus</i> Romagnesi	Lactaire ridulé
<i>Lactarius pubescens</i> (Schrad. →) Fr.	Lactaire pubescent
<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Lactaire à lait brûlant
<i>Lactarius quieticolor</i> Romagnesi	Lactaire orangé gris
<i>Lactarius quietus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire à odeur de punaise
<i>Lactarius repraesentaneus</i> Britzelmayer	Lactaire remarquable
<i>Lactarius robertianus</i> M. Bon	Lactaire brun-violet
<i>Lactarius romagnesii</i> M. Bon	Lactaire très sombre
<i>Lactarius roseozonatus</i>	voir <i>Lactarius flexuosus</i> var. <i>roseozonatus</i>
<i>Lactarius rubrocinctus</i> Fr.	Lactaire à ceinture rouge
<i>Lactarius rufus</i> (Scop. : Fr.) Fr.	Lactaire roux
<i>Lactarius rugatus</i> Kühner et Romagnesi	Lactaire flamboyant
<i>Lactarius ruginosus</i> Romagnesi	Lactaire festonné
<i>Lactarius salmonicolor</i> Heim et Leclair	Lactaire saumon
<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr.	Lactaire sanguin
<i>Lactarius scoticus</i> Berkeley et Broome	Lactaire des hauts-marais
<i>Lactarius scrobiculatus</i> (Scop. : Fr.) Fr.	Lactaire à fossettes
<i>Lactarius semisanguifluus</i> Heim & Leclair	Lactaire semi-sanguin
<i>Lactarius serifluus</i> (de Candolle : Fr.) Fr.	Lactaire petit-lait
<i>Lactarius sphagneti</i> (Fr.) Neuhoﬀ ex Gröger	Lactaire des sphaignes
<i>Lactarius spinosulus</i> Quélet	Lactaire épineux
<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray	Lactaire caoutchouc
<i>Lactarius subsericatus</i>	voir <i>Lactarius britannicus</i>
<i>Lactarius subumbonatus</i> Lindgren	Lactaire chagriné
<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	Lactaire chiffonné
<i>Lactarius tesquorum</i> Malençon	Lactaire des maquis
<i>Lactarius torminosus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Pers.	Lactaire à toison
<i>Lactarius trivialis</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire trivial
<i>Lactarius uvidus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire humide
<i>Lactarius vellereus</i> var. <i>hometii</i> (Gillet) Boudier	Lactaire velouté à lait rosissant
<i>Lactarius vellereus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire velouté
<i>Lactarius vietus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire fané
<i>Lactarius vinosus</i> (Quélet) Quélet	Lactaire vineux
<i>Lactarius violascens</i> (Otto : Fr.) Fr.	Lactaire violascent
<i>Lactarius volemus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire à lait abondant
<i>Lactarius zonarioides</i> Kühner & Romagnesi	Lactaire zoné des épicéas
<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr.	Lactaire zoné
<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull. : Fr.) Murrill	Polypore soufré
<i>Laricifomes officinalis</i> (Villars : Fr.) Kotlaba & Pouzar	Polypore du mélèze
<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.) S.F. Gray	Bolet orangé

Noms latins	Noms français retenus
<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy et Estades	Bolet rude gris-brun
<i>Leccinum carpini</i> (R. Schulz) Moser ex D.A. Reid	Bolet rude des charmes
<i>Leccinum corsicum</i> (Rolland) Singer	Bolet de Corse
<i>Leccinum crocipodium</i> (Letellier) Watling	Bolet craquelé
<i>Leccinum cyaneobasileucum</i> Lannoy et Estades	Bolet rude à base bleue
<i>Leccinum duriusculum</i> (Schulzer von Muggenburg) Singer	Bolet rude des trembles
<i>Leccinum floccopus</i> (E.-J. Gilbert) Redeuilh	Bolet roux
<i>Leccinum holopus</i> (Rostkovius) Watling	Bolet blanc des marais
<i>Leccinum lepidum</i> (Bouchet) M. Bon & Contu	Bolet des chênes verts
<i>Leccinum molle</i> (M. Bon) M. Bon	Bolet mou
<i>Leccinum nucatum</i> Lannoy et Estades	Bolet rude couleur de noix
<i>Leccinum pulchrum</i> Lannoy et Estades	Bolet rude panaché
<i>Leccinum quercinum</i> Pilát & Dermek	Bolet orangé des chênes
<i>Leccinum roseofractum</i> Watling	Bolet rude à chair rose
<i>Leccinum scabrum</i> (Bull. : Fr.) S.F. Gray	Bolet rude
<i>Leccinum variicolor</i> Watling	Bolet ramoneur
<i>Leccinum versipelle</i>	voir <i>Leccinum floccopus</i>
<i>Leccinum vulpinum</i> Watling	Bolet renard
<i>Lentaria afflata</i> (Lagger) Corner	Clavaire couleur de glace
<i>Lentaria delicata</i> (Fr. : Fr.) Corner	Clavaire tendre
<i>Lentaria subcaulescens</i> (Rebentisch : Fr.) S. Rauschert	Clavaire lignicole
<i>Lenzites betulinus</i> (L. : Fr.) Fr.	Lenzite du bouleau
<i>Lenzites warnieri</i> Durieu et Montagne	Lenzite baleine
<i>Lepista flaccida</i> (Sow. : Fr.) Patouillard	Clitocybe inversé des feuillus
<i>Lepista gilva</i> (Pers. : Fr.) Roze	Clitocybe à guttules
<i>Lepista glaucocana</i> (Bresadola) Singer	Tricholome gris glauque
<i>Lepista graveolens</i> (Peck) Dermek	Tricholome malodorant
<i>Lepista inversa</i> (Scop. : Fr.) Patouillard	Clitocybe inversé
<i>Lepista irina</i> (Fr.) Bigelow	Tricholome à odeur d'iris
<i>Lepista martiorum</i> (J. Favre) M. Bon	Clitocybe des Marti
<i>Lepista nebularis</i> (Batsch : Fr.) Harmaja	Clitocybe nébuleux
<i>Lepista nebularis</i> f. <i>alba</i> (J. E. Lange)	Clitocybe nébuleux blanc
<i>Lepista nuda</i> (Bull. : Fr.) Cooke	Pied-bleu
<i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karsten	Argouane des prés
<i>Lepista personata</i> (Fr. : Fr.) Cooke	Pied-violet
<i>Lepista sordida</i> (Schum. : Fr.) Singer	Petit pied bleu
<i>Lepista sordida</i> var. <i>lilacea</i> (Quélet) M. Bon	Tricholome lilas
<i>Leptoporus mollis</i> (Pers. : Fr.) Pilát	Polypore mou
<i>Leucopaxillus alboalutaceus</i> (F.H. Møller) F.H. Møller	Leucopaxille blanc et ocre
<i>Leucopaxillus amarus</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Kühner	Leucopaxille amer
<i>Leucopaxillus candidus</i> (Bresadola) Singer	Leucopaxille blanc
<i>Leucopaxillus compactus</i> (Fr. → Quélet) Neuhoff	Leucopaxille tricolore
<i>Leucopaxillus cutefractus</i> Noordeloos	Leucopaxille craquelé
<i>Leucopaxillus giganteus</i> (Leysser : Fr.) Singer	Leucopaxille géant
<i>Leucopaxillus lepistoides</i> (R. Maire) Singer	Leucopaxille charnu
<i>Leucopaxillus paradoxus</i> (Costantin & Dufour) Boursier	Leucopaxille à odeur de poulailler
<i>Leucopaxillus rhodoleucus</i> (Romell) Kühner	Leucopaxille blanc et rose
<i>Lyophyllum amariusculum</i> Cléménçon	Tricholome amer
<i>Lyophyllum buxum</i> (R. Maire) Konrad & Maublanc	Tricholome des eucalyptus
<i>Lyophyllum caerulescens</i> Cléménçon	Tricholome bleuissant
<i>Lyophyllum connatum</i> (Schum. : Fr.) Singer	Clitocybe en touffes
<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr. : Fr.) Singer	Tricholome en touffes
<i>Lyophyllum favrei</i> (R. Haller & R. Haller Suhr) R. Haller & R.	Tricholome violet et jaune

Noms latins	Noms français retenus
Haller Suhr	
<i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers. : Fr.) P.D. Orton	Tricholome enfumé
<i>Lyophyllum gangraenosum</i> (Fr.) G. Gulden	Tricholome râpeux
<i>Lyophyllum hypoxanthum</i> Jossierand & L. Rioussset	Tricholome des cyprès
<i>Lyophyllum infumatum</i> (Bresadola) Kühner	Tricholome bistre
<i>Lyophyllum loricatum</i> (Fr.) Kalamees	Tricholome cartilagineux
<i>Lyophyllum rhopalopodium</i> Cléménçon	Tricholome à pied obèse
<i>Lyophyllum semitale</i> (Fr. : Fr.) Kalamees	Tricholome salissant
<i>Lyophyllum transforme</i> (Britzelmayer) Singer	Tricholome peau de chamois
<i>Macrotyphula fistulosa</i> (Holmskjöld : Fr.) R.H. Petersen	Clavaire fistuleuse
<i>Macrotyphula juncea</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Berthier	Clavaire filiforme
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	Collybie à lames larges
<i>Melanoleuca arcuata</i> (Bull. : Fr.) Singer	Tricholome arqué
<i>Melanoleuca brevipes</i> (Bull. : Fr.) Patouillard	Tricholome à pied court
<i>Melanoleuca cinereifolia</i> (M. Bon) M. Bon	Tricholome de la dune blanche
<i>Melanoleuca cognata</i> (Fr.) Konrad & Maublanc	Tricholome saumoné
<i>Melanoleuca curtipes</i> (Fr. : Fr.) M. Bon	Tricholome surbaissé
<i>Melanoleuca evenosa</i> (Saccardo) Konrad & Maublanc	Tricholome blanchâtre
<i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull. : Fr.) Patouillard	Tricholome à pied rayé
<i>Melanoleuca kuehneri</i> M. Bon	Tricholome gris souris
<i>Melanoleuca kuehneri</i> var. <i>iris</i> (Kühner) M. Bon	Tricholome suave
<i>Melanoleuca luteolosperra</i> (Britzelmayer) Singer	Tricholome à sporée jaune
<i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers. : Fr.) Murrill	Tricholome noir et blanc
<i>Melanoleuca polioleuca</i> (Fr. : Fr.) Kühner & R. Maire	Tricholome à chair brune
<i>Melanoleuca pseudoluscina</i> M. Bon	Tricholome gracile des dunes
<i>Melanoleuca rasilis</i> (Fr.) Singer	Tricholome gracile des pelouses
<i>Melanoleuca rufipes</i> M. Bon	Tricholome à pied roux
<i>Melanoleuca subbrevipes</i> M. Bon	Tricholome géant
<i>Melanoleuca subpulverulenta</i> (Pers.) Singer	Tricholome prumineux
<i>Melanoleuca verrucipes</i> (Fr.) Singer	Tricholome à pied verruqueux
<i>Meripilus giganteus</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten	Polypore géant
<i>Microcollybia cirrhata</i> (Pers.) Métrod	Collybie mycophage
<i>Microcollybia cookei</i> (Bresadola) Lennox	Collybie à sclérote jaune
<i>Microcollybia tuberosa</i> (Bull. : Fr.) Métrod	Collybie à sclérote noir
<i>Oligoporus</i>	voir <i>Postia</i>
<i>Oligoporus obductus</i>	voir <i>Osteina obducta</i>
<i>Omphalotus illudens</i> (Schw. : Fr.) Saccardo	Faux clitocybe lumineux
<i>Omphalotus olearius</i> (de Candolle : Fr.) Fayod	Faux clitocybe de l'olivier
<i>Onnia leporina</i> (Fr.) Jahn	Polypore fauve
<i>Onnia tomentosa</i>	voir <i>Inonotus tomentosus</i>
<i>Onnia triquetra</i> (Alb. & Schw. → Lenz) Imazeki	Polypore triangulaire
<i>Osteina obducta</i> (Berk.) Donk	Polypore osseux
<i>Oudemansiella melanotricha</i>	voir <i>Xerula melanotricha</i>
<i>Oudemansiella mucida</i> (Schröd. : Fr.) von Höhnel	Collybie visqueuse
<i>Oudemansiella pudens</i>	voir <i>Xerula pudens</i>
<i>Oudemansiella radicata</i>	voir <i>Xerula radicata</i>
<i>Oxyporus obducens</i> (Pers.) Donk	Polypore sosie
<i>Oxyporus populinus</i> (Schum. : Fr.) Donk	Polypore stratifié
<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bull. : Fr.) Ryvarden	Polypore du frêne
<i>Perenniporia medulla-panis</i> (Jacq. : Fr.) Donk	Polypore mie de pain
<i>Perenniporia ochroleuca</i> (Berk.) Ryvarden	Polypore des bruyères
<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr. : Fr.) Patouillard	Polypore éponge
<i>Phellinus erectus</i> A. David, Dequatre & Fiasson	Polypore dressé
<i>Phellinus ferreus</i> (Pers. : Fr.) Bourdot & Galzin	Polypore ferrugineux du chêne

Noms latins	Noms français retenus
<i>Phellinus ferrugineofuscus</i> (P. Karsten) Bourdot	Polypore ferrugineux des conifères
<i>Phellinus ferruginosus</i> (Schrad. : Fr.) Patouillard	Polypore ferrugineux
<i>Phellinus hartigii</i> (Allescher & Schnabl) Patouillard	Polypore du sapin
<i>Phellinus hippophaecola</i> Jahn	Polypore de l'argousier
<i>Phellinus igniarius</i> (L. : Fr.) Quélet	Polypore faux-amadouvier
<i>Phellinus laevigatus</i> (Fr. → P. Karsten) Bourdot & Galzin	Polypore lisse
<i>Phellinus nigricans</i> (Fr. : Fr.) P. Karsten	Polypore noirissant
<i>Phellinus pini</i>	voir <i>Porodaedalea pini</i>
<i>Phellinus robustus</i> (P. Karsten) Bourdot & Galzin	Polypore robuste
<i>Phellinus torulosus</i> (Pers.) Bourdot & Galzin	Polypore rouillé
<i>Phellinus trivialis</i> (Bresadola) Kreisel	Polypore du saule
<i>Phellinus tuberculatus</i> (Baumgartner) Niemelä	Polypore des vergers
<i>Phylloporia ribis</i> (Schum. : Fr.) Ryvardeen	Polypore du groseillier
<i>Phylloporus pelletieri</i> (Léveillé) Quélet	Phyllopore d'Europe
<i>Physisporinus sanguinolentus</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Pilát	Polypore sanguinolent
<i>Physisporinus vitreus</i> (Pers.:Fr.) P. Karsten	Polypore vitreux
<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	Polypore du bouleau
<i>Podofomes trogii</i> (Fr.) Pouzar	Polypore de Trog
<i>Polyporus alveolarius</i> (Bosc : Fr.) Fr.	Polypore du mûrier
<i>Polyporus arcularius</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Polypore alvéolé
<i>Polyporus brumalis</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Polypore d'hiver
<i>Polyporus ciliatus</i> Fr. : Fr.	Polypore cilié
<i>Polyporus corylinus</i> Mauri	Polypore de Tunisie
<i>Polyporus durus</i> (Timm) Kreisel	Polypore bai
<i>Polyporus lentus</i> Berk.	Polypore moucheté
<i>Polyporus leptcephalus</i> (Jacq. : Fr.) Fr.	Polypore variable
<i>Polyporus leptcephalus</i> f. <i>nummularius</i> (Bull. : Fr.) Courtecuisse	Polypore nain
<i>Polyporus melanopus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Polypore à pied noir
<i>Polyporus meridionalis</i> (A. David) Jahn	Polypore des cistes
<i>Polyporus mori</i>	voir <i>Polyporus alveolarius</i>
<i>Polyporus rhizophilus</i> Patouillard	Polypore des steppes
<i>Polyporus squamosus</i> (Huds. : Fr.) Fr.	Polypore écailleux
<i>Polyporus tuberaster</i> (Jacq. : Fr.) Fr.	Polypore à sclérote
<i>Polyporus tunetanus</i>	voir <i>Polyporus corylinus</i>
<i>Porodaedalea conchata</i> (Pers. : Fr.) Fiasson & Niemelä	Polypore à marge dorée
<i>Porodaedalea pini</i> (Thore : Fr.) Murrill	Polypore du pin
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i> (Fr.) E. J. Gilbert	Bolet porphyre
<i>Porpoloma elytroides</i> (Fr.) Singer	Tricholome gris de plomb
<i>Porpoloma macrocephalum</i> (Bohus) M. Bon	Tricholome à grand chapeau
<i>Porpoloma macrorrhizum</i> (Saccardo) M. Bon	Tricholome radicant
<i>Porpoloma metapodium</i> (Fr.) Singer	Tricholome rougissant
<i>Porpoloma pes-caprae</i> (Fr.) Singer	Tricholome pied de chèvre
<i>Porpoloma spinulosum</i> (Kühner & Romagnesi) Singer	Tricholome parfumé
<i>Postia caesia</i> (Schrad. : Fr.) P. Karsten	Polypore bleuté des conifères
<i>Postia floriformis</i> (Quélet) Jülich	Polypore en fleur
<i>Postia fragilis</i> (Fr. : Fr.) Jülich	Polypore fragile
<i>Postia placenta</i> (Fr.) M.J. Larsen & Lombard	Polypore placenta
<i>Postia ptychogaster</i> (F. Ludwig) Vesterholt	Polypore en coussinet
<i>Postia stiptica</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Polypore amer
<i>Postia subcaesia</i> (A. David) Jülich	Polypore bleuté des feuillus
<i>Postia tephroleuca</i> (Fr. : Fr.) Jülich	Polypore souris
<i>Pseudoboletus parasiticus</i> (Bull. : Fr.) Šutara (syn. <i>Xerocomus parasiticus</i>)	Bolet parasite
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull. : Fr.) Singer	Clitocybe en coupe

Noms latins	Noms français retenus
<i>Pseudoclitocybe expallens</i> (Pers. : Fr.) Moser	Clitocybe pâissant
<i>Pseudoomphalina absinthiata</i> (Lasch : Fr.) Knudsen	Clitocybe absinthe
<i>Pseudoomphalina compressipes</i>	voir <i>Pseudoomphalina graveolens</i>
<i>Pseudoomphalina graveolens</i> (S. Petersen) Singer ex Contu & La Rocca	Clitocybe à pied comprimé
<i>Pulveroboletus lignicola</i>	voir <i>Buchwaldoboletus lignicola</i>
<i>Pycnoporellus fulgens</i> (Fr.) Donk	Polypore flamboyant
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq. : Fr.) P. Karsten	Tramète cinabre
<i>Ramaria abietina</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Clavaire des conifères
<i>Ramaria apiculata</i> (Fr. : Fr.) Donk	Clavaire aux yeux verts
<i>Ramaria aurea</i> (J.C. Sch.) Quélet	Clavaire dorée
<i>Ramaria bataillei</i> (R. Maire) Corner	Clavaire rougissante
<i>Ramaria botrytis</i> (Pers. : Fr.) Ricken	Clavaire chou-fleur
<i>Ramaria broomei</i> (Cotton & Wakefield) R. H. Petersen	Clavaire noircissante
<i>Ramaria eumorpha</i> (P. Karsten) Corner	Clavaire palmée des conifères
<i>Ramaria eurosanguinea</i> Courtecuisse, nov. nom.	Clavaire sanguine
<i>Ramaria fennica</i> (P. Karsten) Ricken	Clavaire variable
<i>Ramaria flaccida</i> (Fr. : Fr.) Bourdot	Clavaire élastique
<i>Ramaria flava</i> (J.C. Sch. : Fr.) Quélet	Clavaire jaune
<i>Ramaria flavescens</i> (J.C. Sch.) R.H. Petersen	Clavaire jaunâtre
<i>Ramaria formosa</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Clavaire jolie
<i>Ramaria gracilis</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Clavaire anisée
<i>Ramaria largentii</i> Marr & Stuntz	Clavaire des sapinières
<i>Ramaria neoformosa</i> R.H. Petersen	Clavaire mimétique
<i>Ramaria ochraceovirens</i> (Junghuhn : Fr.) Donk	Clavaire verdissante
<i>Ramaria pallida</i> (J.C. Sch.) Ricken	Clavaire pâle
<i>Ramaria riellii</i> Boudier	Clavaire déformée
<i>Ramaria roellinii</i> Schild	Clavaire des graviers
<i>Ramaria rubella</i> (J.C. Sch. →) R.H. Petersen	Clavaire rougeâtre
<i>Ramaria schildii</i> R.H. Petersen	Clavaire obtuse
<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Clavaire dressée
<i>Ramaria subbotrytis</i> (Coker) Corner	Clavaire rouge corail
<i>Ramariopsis crocea</i> (Pers. : Fr.) Corner	Clavaire safran
<i>Ramariopsis kunzei</i> (Fr. : Fr.) Corner	Clavaire bifurquée
<i>Ramariopsis pulchella</i> (Boudier) Corner	Clavaire lilacine
<i>Rigidoporus ulmarius</i> (Sow. : Fr.) Imazeki	Polypore de l'orme
<i>Rugosomyces carneus</i> (Bull. : Fr.) M. Bon	Collybie carnée
<i>Rugosomyces chrysenteron</i> (Bull. : Fr.) M. Bon	Collybie bouton d'or
<i>Rugosomyces ionides</i> (Bull. : Fr.) M. Bon	Collybie violette
<i>Rugosomyces obscurissimus</i> (A. Pearson) M. Bon	Collybie obscure
<i>Rugosomyces onychinus</i> (Fr.) Raithelhuber	Collybie pourpre et or
<i>Rugosomyces persicolor</i> (Fr.) M. Bon	Collybie couleur de pêche
<i>Russula acetolens</i> S. Rauschert	Russule vinaigrée
<i>Russula acrifolia</i> Romagnesi ex Romagnesi	Russule à lames âcres
<i>Russula adulterina</i> (Fr.) Peck	Russule bâtarde
<i>Russula adusta</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Russule brûlée
<i>Russula adusta</i> var. <i>sabulosa</i> (Heim & Blum) ex M. Bon	Russule brûlée des sables
<i>Russula aeruginea</i> Lindblad	Russule vert-de-gris
<i>Russula albonigra</i> (Krombholz) Fr.	Russule blanche et noire
<i>Russula alnetorum</i> Romagnesi	Russule des aulnes verts
<i>Russula alutacea</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Russule alutacée
<i>Russula amara</i> Kucera	Russule mamelonnée
<i>Russula amarissima</i> Romagnesi & E.-J. Gilbert	Russule très amère

Noms latins	Noms français retenus
<i>Russula amethystina</i> Quélet	Russule améthyste
<i>Russula amoena</i> Quélet	Russule veloutée
<i>Russula amoenicolor</i> f. <i>nigrosanguinea</i> Romagnesi [inval.]	Russule sang de bœuf
<i>Russula amoenicolor</i> Romagnesi ex Romagnesi	Russule panachée
<i>Russula amoenolens</i> Romagnesi	Russule à odeur de topinambour
<i>Russula anatina</i> Romagnesi ex Romagnesi	Russule plume de canard
<i>Russula anthracina</i> Romagnesi	Russule anthracite
<i>Russula anthracina</i> var. <i>carneifolia</i> Romagnesi	Russule anthracite à lames carnées
<i>Russula anthracina</i> var. <i>insipida</i> Romagnesi	Russule anthracite insipide
<i>Russula aquosa</i> Leclair	Russule aqueuse
<i>Russula armoricana</i> Romagnesi & Le Gal	Russule bretonne
<i>Russula artesiana</i> M. Bon	Russule de l'Artois
<i>Russula atroglauca</i> Einhellinger	Russule glauque
<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	Russule pourpre et noire
<i>Russula atropurpurea</i> var. <i>depallens</i> (Pers. : Fr.) R. Maire	Russule pourpre et noire décolorée
<i>Russula atrorubens</i> Quélet	Russule rouge et noire
<i>Russula aurea</i> Pers.	Russule dorée
<i>Russula aurea</i> var. <i>axantha</i> (Romagnesi) M. Bon	Russule dorée, variété sans jaune
<i>Russula aurora</i> Krombholz	Russule aurore
<i>Russula azurea</i> Bresadola	Russule azurée
<i>Russula badia</i> Quélet	Russule perfide
<i>Russula barlae</i> Quélet	Russule de Barla
<i>Russula betularum</i> Hora	Russule émétique des bouleaux
<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	Russule brun violacé
<i>Russula camarophylla</i> Romagnesi	Russule hygrophore
<i>Russula campestris</i> (Romagnesi) Romagnesi ex M. Bon	Russule champêtre
<i>Russula carminipes</i> Blum	Russule à pied carmin
<i>Russula carpini</i> Girard & Heinemann	Russule des charmes
<i>Russula cavipes</i> Britzelmayr	Russule à pied creux
<i>Russula cessans</i> A. Pearson	Russule tardive
<i>Russula chamiteae</i> Kühner	Russule écrevisse des saules nains
<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	Russule à lames glauques
<i>Russula cicatricata</i> Romagnesi ex M. Bon	Russule écrevisse ridée
<i>Russula cistoadelpha</i> Moser & Trimbach	Russule des cistes
<i>Russula clariana</i> Heim ex Kuyper & van Vuure	Russule des peupliers blancs
<i>Russula claroflava</i> Grove	Russule jaune noircissante
<i>Russula clavipes</i> Velenovsky	Russule écrevisse des bouleaux
<i>Russula consobrina</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Russule bistre
<i>Russula cremeoavellanea</i> Singer	Russule isabelle
<i>Russula cuprea</i> Krombholz	Russule cuivrée
<i>Russula curtipes</i> F.H. Møller & J. Schäffer	Russule à pied court
<i>Russula cutefracta</i> Cooke	Russule charbonnière craquelée
<i>Russula cyanoxantha</i> (J.C. Sch.) Fr.	Russule charbonnière
<i>Russula cyanoxantha</i> f. <i>peltereaui</i> Singer	Russule charbonnière verte
<i>Russula cyanoxantha</i> var. <i>flavoviridis</i> (Romagnesi) Sarnari	Russule charbonnière jaune-vert
<i>Russula decipiens</i> (Singer) Kühner & Romagnesi ex Svrček	Russule trompeuse
<i>Russula decolorans</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Russule orangée grisonnante
<i>Russula delica</i> Fr.	Russule faux-lactaire
<i>Russula densifolia</i> Gillet	Russule à lames serrées
<i>Russula densissima</i> (J. Schäffer) ex Romagnesi	Russule noireude
<i>Russula dryadicola</i> Fellner & Landa	Russule des dryades
<i>Russula emetica</i> (J.C. Sch. : Fr.) Pers.	Russule émétique
<i>Russula emeticicolor</i> J. Schäffer	Russule mimétique

Noms latins	Noms français retenus
<i>Russula exalbicans</i> (Pers.) Melzer & Zvara	Russule pâissante
<i>Russula fageticola</i> (Melzer) ex Lundell	Russule émétique des hêtres
<i>Russula faginea</i> Romagnesi ex Romagnesi	Russule écrevisse des hêtres
<i>Russula farinipes</i> Romell	Russule à pied farineux
<i>Russula favrei</i> Moser	Russule écrevisse de montagne
<i>Russula fellea</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Russule de fiel
<i>Russula firmula</i> J. Schäffer	Russule petite pomme
<i>Russula flavispora</i> (Blum) ex Romagnesi	Russule faux-lactaire à sporée jaune
<i>Russula foetens</i> (Pers. : Fr.) Pers.	Russule fétide
<i>Russula font-queri</i> Singer ex Singer	Russule saumonée des bouleaux
<i>Russula fragilis</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Russule fragile
<i>Russula fragilis</i> f. <i>fallax</i> (J.C. Sch.) Masee	Russule fragile trompeuse
<i>Russula fragrans</i> Romagnesi	Russule frangipane douce
<i>Russula fragrantissima</i> Romagnesi	Russule à odeur d'anis
<i>Russula fuscorubra</i> (Bresadola) Blum	Russule rouge sombre
<i>Russula fuscorubroides</i> M. Bon	Russule fausse rouge sombre
<i>Russula galochroa</i> (Fr.) Saccardo	Russule laiteuse
<i>Russula gigasperma</i> Romagnesi ex Romagnesi	Russule à spores géantes
<i>Russula gracillima</i> J. Schäffer	Russule gracile
<i>Russula graveolens</i> Romell	Russule écrevisse des chênes
<i>Russula grisea</i> (Pers. →) Fr.	Russule grise
<i>Russula griseascens</i> (M. Bon & Gaugué) L. Marti	Russule émétique grisonnante
<i>Russula helios</i> Malençon ex Sarnari	Russule du Midi
<i>Russula helodes</i> Melzer	Russule sanguine des marais
<i>Russula heterophylla</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Russule à lames fourchues
<i>Russula ilicis</i> Romagnesi, Chevassut & Privat	Russule des chênes verts
<i>Russula illota</i> Romagnesi	Russule mal lavée
<i>Russula insignis</i> Quélet	Russule à voile jaune
<i>Russula integra</i> (L. : Fr.) R. Maire	Russule des épicéas
<i>Russula intermedia</i> P. Karsten	Russule rouge des bouleaux
<i>Russula ionochlora</i> Romagnesi ex Romagnesi	Russule verte et violette
<i>Russula juniperina</i> Ubaldi	Russule des genévriers
<i>Russula knauthii</i> (Singer) Kühner & Romagnesi ex Hora	Russule fragile à centre noir
<i>Russula laccata</i> Huijsman	Russule de Norvège
<i>Russula laeta</i> F.H. Møller & J. Schäffer	Russule gaie
<i>Russula langei</i> M. Bon	Russule charbonnière à pied dur
<i>Russula laricina</i> Velenovsky	Russule des mélèzes
<i>Russula laurocerasi</i> Melzer	Russule frangipane
<i>Russula lepida</i> Fr.	Russule jolie
<i>Russula lepidicolor</i> Romagnesi	Russule fausse-aurore
<i>Russula lilacea</i> Quélet	Russule lilas
<i>Russula lutensis</i> Romagnesi & Le Gal	Russule des bourbiers
<i>Russula luteotacta</i> Rea	Russule jaunissante
<i>Russula maculata</i> Quélet	Russule maculée
<i>Russula medullata</i> Romagnesi ex Romagnesi	Russule à pied farci
<i>Russula melitodes</i> Romagnesi	Russule des trembles
<i>Russula melliolens</i> Quélet	Russule à odeur de miel
<i>Russula melzeri</i> Zvara	Russule tache-de-sang
<i>Russula minutula</i> Velenovsky	Russule minuscule
<i>Russula monspeliensis</i> Sarnari	Russule des cistes de Montpellier
<i>Russula mustelina</i> Fr.	Russule belette
<i>Russula nana</i> Killerman	Russule naine
<i>Russula nauseosa</i> (Pers.) Fr.	Russule précoce

Noms latins	Noms français retenus
<i>Russula nigricans</i> (Bull. →) Fr.	Russule noircissante
<i>Russula nitida</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Russule brillante des bouleaux
<i>Russula nitida</i> f. <i>heterosperma</i> (Singer) M. Bon	Russule brillante des sphaignes
<i>Russula nobilis</i> Velenovsky	Russule émétique compacte
<i>Russula ochracea</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Russule ochracée
<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Russule ocre et blanche
<i>Russula ochrospora</i> (Nicolai ex Quadraccia & W. Rossi) Quadraccia	Russule à sporée ocre
<i>Russula odorata</i> Romagnesi	Russule odorante
<i>Russula olivacea</i> (J.C. Sch.) Fr.	Russule olivacée
<i>Russula olivascens</i> (Pers. →) Fr.	Russule olivâtre
<i>Russula pallidospora</i> (Blum) ex Romagnesi	Russule faux-lactaire à sporée crème
<i>Russula paludosa</i> Britzelmayr	Russule des marais
<i>Russula parazurea</i> J. Schäffer	Russule bleu-vert
<i>Russula pascua</i> (F.H. Møller & J. Schäffer) Kühner	Russule écrevisse des alpages
<i>Russula pectinata</i> Fr.	Russule pectinée
<i>Russula pectinatoides</i> Peck, ss. aut. europ.	voir <i>Russula praetervisa</i>
<i>Russula pelargonica</i> Niole	Russule à odeur de géranium
<i>Russula persicina</i> Krombholz	Russule couleur de pêche
<i>Russula poikilochroa</i> Sarnari	Russule polychrome
<i>Russula praetervisa</i> Sarnari	Russule à odeur de boudin
<i>Russula pseudointegra</i> Arnoult & Goris	Russule coccinée
<i>Russula pseudopuellaris</i> (M. Bon) M. Bon	Russule des terrils
<i>Russula puellaris</i> Fr.	Russule jeune fille
<i>Russula puellula</i> Ebbensen, F.H. Møller & J. Schäffer	Russule timide
<i>Russula pumila</i> Rouzeau & Massart	Russule des aulnaies
<i>Russula purpurata</i> (Crawshay) Romagnesi ex M. Bon	Russule écrevisse pourpre
<i>Russula queletii</i> Fr.	Russule de Quélet
<i>Russula raoultii</i> Quélet	Russule jaune pâle
<i>Russula rhodopus</i> Zvara	Russule à pied rouge
<i>Russula risigallina</i> (Batsch) Saccardo	Russule caméléon
<i>Russula risigallina</i> f. <i>luteorosella</i> (Britzelmayr) M. Bon	Russule caméléon jaune et rose
<i>Russula romellii</i> R. Maire	Russule à lames fragiles
<i>Russula roseicolor</i> Blum	Russule bouton de rose
<i>Russula rubra</i> (Lamarck : Fr.) Fr.	Russule de velours rouge
<i>Russula rubroalba</i> (Singer) Romagnesi	Russule rouge et blanche
<i>Russula rutila</i> Romagnesi ex Romagnesi	Russule rutilante
<i>Russula saliceticola</i> (Singer) Kühner ex Knudsen & T. Borgen	Russule des saulaies alpines
<i>Russula sanguinaria</i> (Bull. → Schum.) S. Rauschert	Russule sanguine
<i>Russula sanguinaria</i> f. <i>pseudorosacea</i> (R. Maire) M. Bon	Russule sanguine jaunissante
<i>Russula sardonica</i> Fr.	Russule sardoine
<i>Russula sardonica</i> var. <i>mellina</i> Melzer	Russule sardoine jaune
<i>Russula seperina</i> Dupain	Russule noircie
<i>Russula sericatula</i> Romagnesi	Russule soyeuse
<i>Russula silvestris</i> (Singer) Reumaux	Russule émétique des chênes
<i>Russula solaris</i> Ferdinansen & Winge	Russule soleil
<i>Russula sororia</i> (Fr.) Romell	Russule à odeur spermatique
<i>Russula straminea</i> Malençon	Russule couleur paille
<i>Russula suberretorum</i> Dagron	Russule des chênes-liège
<i>Russula subfoetens</i> W.G. Smith	Russule fausse-fétide
<i>Russula sublevispora</i> (Romagnesi) Romagnesi ex M. Bon	Russule grise des peupliers
<i>Russula subrubens</i> (J.E. Lange) M. Bon	Russule écrevisse des saules

Noms latins	Noms français retenus
<i>Russula subterfucata</i> Romagnesi ex Romagnesi	Russule pastel
<i>Russula taeniospora</i> Einhellinger	Russule carmin
<i>Russula terenopus</i> Romagnesi	Russule à pied fragile
<i>Russula tinctipes</i> Blum ex M. Bon	Russule à pied teinté
<i>Russula torulosa</i> Bresadola	Russule des pinèdes
<i>Russula turci</i> Bresadola	Russule cocardée
<i>Russula urens</i> Romell ex Singer	Russule brûlante
<i>Russula velenovskyi</i> Melzer & Zvara	Russule rouge cuivre
<i>Russula versatilis</i> Romagnesi	Russule versatile
<i>Russula versicolor</i> J. Schäffer	Russule versicolore
<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule vieux-rose
<i>Russula veteriosa</i> Fr.	Russule rose bonbon
<i>Russula vinosa</i> Lindblad	Russule vineuse
<i>Russula vinosobrunnea</i> (Bresadola) Romagnesi	Russule brun vineux
<i>Russula vinosobrunnea</i> var. <i>paraolivacea</i> M. Bon	Russule olivacée des chênes verts
<i>Russula vinosopurpurea</i> J. Schäffer	Russule lie-de-vin
<i>Russula violacea</i> Quélet	Russule violacée
<i>Russula violeipes</i> f. <i>citrina</i> (Quélet) Romagnesi	Russule citrine
<i>Russula violeipes</i> Quélet	Russule à pied violet
<i>Russula virescens</i> (J.C. Sch.) Fr.	Russule verdoyante
<i>Russula viscida</i> Kudrna	Russule à pied brunissant
<i>Russula xerampelina</i> (J.C. Sch.) Fr.	Russule écrevisse
<i>Russula zonatula</i> Ebbensen & J. Schäffer	Russule jovencelle
<i>Russula zvarae</i> Velenovsky	Russule rose tendre
<i>Scenidium nitidum</i>	voir <i>Hexagonia nitida</i>
<i>Schizophyllum commune</i> Fr. : Fr.	Schizophylle commun
<i>Scutigera confluens</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Bondarzew & Singer	Polypore confluent
<i>Scutigera cristatus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Bondarzew & Singer	Polypore craquelé
<i>Scutigera ovinus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Murrill	Polypore des brebis
<i>Scutigera pes-caprae</i> (Pers. : Fr.) Bondarzew & Singer	Polypore pied-de-chèvre
<i>Skeletocutis amorphia</i> (Fr. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	Tramète saumonée
<i>Skeletocutis nivea</i> (Junghuhn) Keller	Tramète blanc de neige
<i>Spongipellis delectans</i> (Peck) Murrill	Polypore spongieux
<i>Spongipellis pachyodon</i> (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	Polypore denté
<i>Spongipellis schulzeri</i>	voir <i>Spongipellis delectans</i>
<i>Spongipellis spumeus</i> (Sow. : Fr.) Patouillard	Polypore cotonneux
<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop. : Fr.) Berk.	Bolet pomme de pin
<i>Strobilurus esculentus</i> (Wulfen : Fr.) Singer	Collybie des cônes d'épicéa
<i>Strobilurus stephanocystis</i> (Kühner & Romagnesi ex Hora) Singer	Collybie des cônes de pin
<i>Strobilurus tenacellus</i> (Pers. : Fr.) Singer	Collybie tenace
<i>Suillus bellinii</i> (Inzenga) O. Kuntze	Bolet de Bellini
<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet des bouviers
<i>Suillus bresadolae</i> (Quélet) Gerhold	Bolet hybride
<i>Suillus collinitus</i> (Fr.) O. Kuntze	Bolet à base rose
<i>Suillus flavidus</i> (Fr. : Fr.) Presl	Bolet jaunâtre
<i>Suillus granulatus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet granulé
<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch : Fr.) Singer	Bolet élégant
<i>Suillus luteus</i> (L. : Fr.) Roussel	Nonnette voilée
<i>Suillus mediterraneensis</i> (Jacquetant & Blum) Redeuilh	Bolet méditerranéen
<i>Suillus placidus</i> (Bonorden) Singer	Bolet ivoire
<i>Suillus plorans</i> (Rolland) O. Kuntze	Bolet larmoyant
<i>Suillus sibiricus</i> (Singer) Singer	Bolet de Sibérie
<i>Suillus tridentinus</i> (Bresadola) Singer	Bolet du Trentin

Noms latins	Noms français retenus
<i>Suillus variegatus</i> (Swartz : Fr.) Richon & Roze	Bolet moucheté
<i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel	Bolet gris des mélèzes
<i>Tephrocycbe ambusta</i> (Fr. : Fr.) Donk	Collybie des sols brûlés
<i>Tephrocycbe anthracophila</i> (Lasch) P.D. Orton	Collybie charbonnière
<i>Tephrocycbe atrata</i> (Fr. : Fr.) Donk	Collybie noirâtre
<i>Tephrocycbe boudieri</i> (Kühner & Romagnesi) Derbsch	Collybie poudrée
<i>Tephrocycbe graminicola</i> M. Bon	Collybie des pelouses
<i>Tephrocycbe mephitica</i> (Fr.) Moser	Collybie moisie
<i>Tephrocycbe ozes</i> (Fr.) M. Bon	Collybie négligée
<i>Tephrocycbe palustris</i> (Peck) Donk	Collybie des marais
<i>Tephrocycbe rancida</i> (Fr. : Fr.) Donk	Collybie rance
<i>Tephrocycbe striaepilea</i> (Fr.) Donk	Collybie striée
<i>Tephrocycbe tesquorum</i> (Fr.) Moser	Collybie des friches
<i>Tephrocycbe tylicolor</i> (Fr. : Fr.) Moser	Collybie gris carné
<i>Trametes gibbosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Tramète bossue
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen : Fr.) Pilát	Tramète hirsute
<i>Trametes multicolor</i>	voir <i>Trametes ochracea</i>
<i>Trametes ochracea</i> (Pers.) Gilbertson & Ryvarden	Tramète zonée
<i>Trametes pubescens</i> (Schum. : Fr.) Pilát	Tramète pubescente
<i>Trametes suaveolens</i> (L. : Fr.) Fr.	Tramète parfumée
<i>Trametes velutinus</i> (Planer ex Fries) Cunn.	Tramète veloutée
<i>Trametes versicolor</i> (L. : Fr.) Lloyd	Tramète versicolore
<i>Trichaptum abietinum</i> (Dicks. : Fr.) Ryvarden	Tramète lilas
<i>Trichaptum bifforme</i> (Fr.) Ryvarden	Tramète du chêne-liège
<i>Trichaptum hollii</i> (J.C. Schmidt : Fr.) Kreisel	Tramète déchirée
<i>Trichaptum laricinum</i> (Karsten) Ryvarden	Tramète du mélèze
<i>Tricholoma acerbum</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Tricholome âpre
<i>Tricholoma aestuans</i> (Fr. : Fr.) Gillet	Tricholome brûlant
<i>Tricholoma albidum</i> M. Bon	Tricholome ivoire
<i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Tricholome brun et blanc
<i>Tricholoma album</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	Tricholome blanc
<i>Tricholoma apium</i> J. Schäffer	Tricholome céleri
<i>Tricholoma argyraceum</i> (Bull.) Gillet	Tricholome argenté
<i>Tricholoma arvernense</i> M. Bon	Tricholome d'Auvergne
<i>Tricholoma atosquamosum</i> Saccardo	Tricholome à squames noires
<i>Tricholoma aurantium</i> (J.C. Sch. : Fr.) Ricken	Tricholome orangé
<i>Tricholoma auratum</i> (L. : Fr.) Gillet	Tricholome doré
<i>Tricholoma basirubens</i> (M. Bon) Riva & M. Bon	Tricholome à base rouge
<i>Tricholoma batschii</i> M. Christensen & Noordeloos	Tricholome à pied bicolore
<i>Tricholoma bresadolanium</i> Cléménçon	Tricholome vergeté des feuillus
<i>Tricholoma bufonium</i> (Pers. : Fr.) Gillet	Tricholome pourpré
<i>Tricholoma caligatum</i> (Viviani) Ricken	Tricholome chaussé
<i>Tricholoma cedretorum</i> (M. Bon) Riva	Tricholome des cèdres
<i>Tricholoma cedretorum</i> var. <i>ochraceopallidum</i> (M. Bon) Riva	Tricholome des cèdres, variété pâle
<i>Tricholoma chrysophyllum</i> Riva, C. E. Hermsilla & J. Sánchez	Tricholome à lames jaunes
<i>Tricholoma cingulatum</i> (Almf. : Fr.) Jacobasch	Tricholome ceinturé
<i>Tricholoma colossus</i> (Fr.) Quélet	Tricholome colosse
<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome colombette
<i>Tricholoma coryphaeum</i> (Fr.) Gillet	Tricholome à marge jaune
<i>Tricholoma equestre</i> (L. : Fr.) Kummer	Tricholome équestre
<i>Tricholoma filamentosum</i> (Alessio) Alessio	Tricholome tigré pâle
<i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Ricken	Tricholome cravaté
<i>Tricholoma frondosae</i> Kalamees & Shtshukin	Tricholome équestre des peupliers

Noms latins	Noms français retenus
<i>Tricholoma fulvum</i> (Retz. : Fr.) Costantin & Dufour	Tricholome fauve
<i>Tricholoma hemisulphureum</i> (M. Bon) Riva	Tricholome soufré des montagnes
<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome imbriqué
<i>Tricholoma inamoenum</i> (Fr. : Fr.) Gillet	Tricholome à odeur de gaz
<i>Tricholoma inocybeoides</i> A. Pearson	Tricholome conique
<i>Tricholoma joachimii</i> M. Bon & Riva	Tricholome de Joachim
<i>Tricholoma josserandii</i> M. Bon	Tricholome faux-prétentieux
<i>Tricholoma lascivum</i> (Fr. : Fr.) Gillet	Tricholome écoeurant
<i>Tricholoma leucoterreum</i> Mariotto & Turetta	Tricholome terreux blanc
<i>Tricholoma luridum</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	Tricholome blafard
<i>Tricholoma matsutake</i> S. Ito & Imai	Matsutake
<i>Tricholoma orirubens</i> Quélet	Tricholome à marge rouge
<i>Tricholoma pardinum</i> (Pers.) Quélet	Tricholome tigré
<i>Tricholoma pessundatum</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Tricholome farineux des pins
<i>Tricholoma populinum</i> J.E. Lange	Tricholome des peupliers
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Tricholome prétentieux
<i>Tricholoma psammopus</i> (Kalchbrenner) Quélet	Tricholome sablé
<i>Tricholoma pseudonictitans</i> M. Bon	Tricholome luisant
<i>Tricholoma roseoacereum</i> Riva	Tricholome acerbe rose
<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome savonneux
<i>Tricholoma saponaceum</i> f. <i>ardosiacum</i> (Bresadola) M. Bon	Tricholome savonneux ardoisé
<i>Tricholoma saponaceum</i> var. <i>napipes</i> (Krombholz) Barla	Tricholome savonneux à lames jaunes
<i>Tricholoma saponaceum</i> var. <i>squamosum</i> (Cooke) Rea	Tricholome savonneux à écailles
<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.) Quélet	Tricholome farineux jaunissant
<i>Tricholoma sciodes</i> (Pers.) C. Martin	Tricholome gris perfide
<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sow. : Fr.) Quélet	Tricholome jaunet
<i>Tricholoma sejunctum</i> var. <i>coniferarum</i> M. Bon	Tricholome jaunet des conifères
<i>Tricholoma squarrulosum</i> Bresadola	Tricholome à pied écaillé
<i>Tricholoma stans</i> (Fr.) Saccardo	Tricholome élancé
<i>Tricholoma stiparophyllum</i> (Lund) P. Karsten	Tricholome blanc des bouleaux
<i>Tricholoma sulfurescens</i> Bresadola	Tricholome jaunissant
<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull. : Fr.) Kummer	Tricholome soufré
<i>Tricholoma sulphureum</i> var. <i>coronarium</i> (Pers.) Gillet	Tricholome soufré forme crapaudine
<i>Tricholoma terreum</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	Tricholome terreux OU Petit-gris
<i>Tricholoma triste</i> (Scop. : Fr.) Quélet	Tricholome triste
<i>Tricholoma umbonatum</i> (J.E. Lange) Clémenton & M. Bon	Tricholome omboné
<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome brûlé
<i>Tricholoma ustaloides</i> Romagnesi	Tricholome brûlé amer
<i>Tricholoma vaccinum</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	Tricholome couleur de vache
<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Tricholome vergeté
<i>Tricholomella constricta</i> (Fr. : Fr.) Kalamees	Tricholome urbain
<i>Tricholomella leucocephala</i> (Bull. : Fr.) M. Bon	Tricholome blanc radicant
<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr. : Fr.) Singer	Tricholome décoré
<i>Tricholomopsis flammula</i> (Métrod ex E. Ludwig) P.-A. Moreau & Courtecuisse	Tricholome petite flamme
<i>Tricholomopsis ornata</i> (Fr.) Singer	Tricholome orné
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (J.C. Sch. : Fr.) Singer	Tricholome rutilant
<i>Tricholosporum cossonianum</i> (R. Maire) P.-A. Moreau & Contu	Tricholome d'Algérie
<i>Tricholosporum goniospermum</i> (Bresadola) Baroni	Tricholome neutre
<i>Typhula abietina</i> (Fuckel) Corner	Typhule des sapins
<i>Typhula corallina</i> Quélet & Patouillard	Typhule corail

Noms latins	Noms français retenus
<i>Typhula culmigena</i> (Montagne & Fr.) J. Schröter	Typhule des chaumes
<i>Typhula erythropus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Typhule à pied rouge
<i>Typhula fruticum</i> (P. Karsten) P. Karsten	Typhule blanche des fruits
<i>Typhula micans</i> (Pers. : Fr.) Berthier	Typhule brillante
<i>Typhula subvariabilis</i> Berthier	Typhule variable
<i>Tylopilus felleus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	Bolet amer
<i>Tyromyces chioneus</i> (Fr. : Fr.) P. Karsten	Polypore blanc de neige
<i>Xerocomus armeniacus</i> (Quélet) Quélet	Bolet abricot
<i>Xerocomus badius</i> (Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilbert	Bolet bai
<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quélet	Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus communis</i> (Bull.) M. Bon	Bolet commun
<i>Xerocomus dryophilus</i> (Thiers) Singer	Bolet californien
<i>Xerocomus ferrugineus</i> (J.C. Sch.) M. Bon	Bolet ferrugineux
<i>Xerocomus leonis</i> (D.A. Reid) M. Bon	Bolet jaune lion
<i>Xerocomus parasiticus</i>	voir <i>Pseudoboletus parasiticus</i>
<i>Xerocomus persicolor</i> Engel, Klofac, H. Grünert & R. Grünert	Bolet couleur de pêche
<i>Xerocomus porosporus</i> Imler ex Imler	Bolet fissuré
<i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr.) Quélet	Bolet pruineux
<i>Xerocomus ripariellus</i> Redeuilh	Bolet des bords de mares
<i>Xerocomus rubellus</i> Quélet	Bolet framboise
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L. : Fr.) Quélet	Bolet tomenteux
<i>Xerula melanotricha</i> Dörfelt	Collybie à poils noirs
<i>Xerula pudens</i> (Pers. : Fr.) Singer	Collybie à poils ras
<i>Xerula radicata</i> (Rehl. : Fr.) Dörfelt	Collybie radicante

B. Liste des espèces (par nom français)

Noms français retenus	Noms latins
Agaric à écailles jaunes	<i>Agaricus xantholepis</i> (F. H. Møller) F. H. Møller
Agaric à écailles sombres	<i>Agaricus phaeolepidotus</i> (F. H. Møller) F. H. Møller
Agaric à flocons	<i>Agaricus subfloccosus</i> (J. E. Lange) Hlaváček
Agaric à grandes écailles	<i>Agaricus macrolepis</i> (Pilát & Pouzar) Boisselet et Courtecuisse
Agaric à odeur iodée	<i>Agaricus iodosmus</i> Heinem.
Agaric à pied bulbeux	<i>Agaricus essettei</i> Bon (syn. <i>Ag. abruptibulbus</i>)
Agaric à pied en fuseau	<i>Agaricus bohusii</i> M. Bon
Agaric à pied floconneux	<i>Agaricus moellerianus</i> Bon
Agaric à pied laineux	<i>Agaricus lanipes</i> (F. H. Møller et J. Schäff.) Hlaváček
Agaric à toison blanche	<i>Agaricus leucotrichus</i> (F. H. Møller) F. H. Møller
Agaric améthyste	<i>Agaricus purpurellus</i> (F. H. Møller) F. H. Møller
Agaric anisé des bois	<i>Agaricus silvicola</i> (Vittad.) Peck
Agaric blanc jaunissant	<i>Agaricus huijsmanii</i> Courtecuisse (syn. <i>Ag. niveolutescens</i>)
Agaric blanc sanguinolent	<i>Agaricus benesii</i> (Pilát) Singer (syn. <i>Ag. albosanguineus</i>)
Agaric brun cuivré	<i>Agaricus cupreobrunneus</i> (F. H. Møller) Pilát
Agaric champêtre OU Rosé-des-prés	<i>Agaricus campestris</i> L.

Noms français retenus	Noms latins
Agaric d'Anna	<i>Agaricus annae</i> Pilát (syn. <i>Ag. silvaticus</i> var. <i>pallens</i>)
Agaric de l'arrière-dune	<i>Agaricus koelerionensis</i> Bon
Agaric de la pampa	<i>Agaricus pampeanus</i> Spegazzini
Agaric de Pilát	<i>Agaricus pilatianus</i> Bohus
Agaric de printemps	<i>Agaricus heimii</i> Bon (syn. <i>Ag. aestivalis</i> var. <i>veneris</i>)
Agaric des bords de route	<i>Agaricus capellianus</i> J. Hlaváček (syn. <i>Ag. vaporarius</i>)
Agaric des cyprés	<i>Agaricus cupressicola</i> Bon et Grilli
Agaric des dunes	<i>Agaricus devoniensis</i> P. D. Orton
Agaric des forêts	<i>Agaricus silvaticus</i> J. C. Sch.
Agaric des jachères OU Boule-de-neige	<i>Agaricus arvensis</i> J. C. Sch. : Fr.
Agaric des prés salés	<i>Agaricus bernardii</i> (Quélet.) Quélet
Agaric des robiniers	<i>Agaricus bresadolanus</i> Bohus
Agaric des trottoirs	<i>Agaricus bitorquis</i> (Quélet) Saccardo
Agaric d'été	<i>Agaricus albosericeus</i> S. Rauschert (syn. <i>Ag. aestivalis</i>)
Agaric élégant	<i>Agaricus comtulus</i> Fr.
Agaric élevé	<i>Agaricus altipes</i> (F. H. Møller) Pilát
Agaric éminent	<i>Agaricus excellens</i> F. H. Møller
Agaric épais	<i>Agaricus spissicaulis</i> F. H. Møller
Agaric fibrilleux	<i>Agaricus fuscofibrillosus</i> (F. H. Møller) Pilát
Agaric fissuré	<i>Agaricus fissuratus</i> (F. H. Møller) F. H. Møller
Agaric géant des Alpes	<i>Agaricus urinascens</i> var. <i>kuehnerianus</i> (Heinemann) Courtecuisse
Agaric géant des bois	<i>Agaricus macrocarpus</i> (F. H. Møller) F. H. Møller
Agaric géant des prés	<i>Agaricus urinascens</i> (J. Schäffer & F. H. Møller) Singer
Agaric guêtré	<i>Agaricus subperonatus</i> (J. E. Lange) Singer
Agaric impérial	<i>Agaricus augustus</i> Fr.
Agaric impérial blanc	<i>Agaricus augustus</i> var. <i>albus</i> Mos.
Agaric impudique	<i>Agaricus impudicus</i> (Rea) Pilát
Agaric jaunissant	<i>Agaricus xanthoderma</i> Genevier
Agaric jaunissant des dunes	<i>Agaricus menieri</i> Bon
Agaric lie-de-vin	<i>Agaricus boisseletii</i> Heinem.
Agaric loqueteux	<i>Agaricus depauperatus</i> (F. H. Møller) Pilát
Agaric malodorant	<i>Agaricus maleolens</i> F. H. Møller
Agaric moucheté	<i>Agaricus variegans</i> F. H. Møller
Agaric neigeux	<i>Agaricus osecanus</i> Pilát (syn. <i>Ag. nivescens</i>)
Agaric pintade	<i>Agaricus moelleri</i> Wasser (syn. <i>Ag. praeclaresquamosus</i>)
Agaric porphyre	<i>Agaricus porphyrizon</i> P. D. Orton
Agaric pourpré	<i>Agaricus porphyrocephalus</i> F. H. Møller
Agaric radicant	<i>Agaricus romagnesii</i> Wasser (syn. <i>Ag. infidus</i>)
Agaric robuste	<i>Agaricus bitorquis</i> var. <i>validus</i> (F. H. Møller) Bon et Cappelli
Agaric rougissant	<i>Agaricus langei</i> (F. H. Møller) F. H. Møller
Agaric sanguinolent	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulzer
Agaric solitaire	<i>Agaricus semotus</i> Fr.
Agaric squamuleux	<i>Agaricus squamulifer</i> (F. H. Møller) Pilát
Agaric taché de jaune	<i>Agaricus luteomaculatus</i> (F. H. Møller) F. H. Møller
Agaric vineux	<i>Allopsalliota geesteranii</i> (Bas & Heinemann) Nauta & Bas
Agaric volvacé des cyprés	<i>Agaricus gennadii</i> (Chatin et Boud.) P. D. Orton
Agaric volvacé des serres	<i>Agaricus pequinii</i> (Boudier) Konrad & Maublanc
Alnicole à odeur de géranium	<i>Alnicola geraniolens</i> Courtecuisse
Alnicole à pied blanc	<i>Alnicola rubriceps</i> (P.D. Orton) Courtecuisse
Alnicole amère	<i>Alnicola amarescens</i> (Quélet) Heim & Romagnesi
Alnicole commune	<i>Alnicola umbrina</i> (R. Maire) Kühner
Alnicole de Bohême	<i>Alnicola bohémica</i> (Velenovsky) Kühner & R. Maire

Noms français retenus	Noms latins
Alnicole de fiel	<i>Alnicola cholea</i> Kühner
Alnicole des saules	<i>Alnicola macrospora</i> (J.E. Lange) J. Favre
Alnicole des saules nains	<i>Alnicola tantilla</i> (J. Favre) Romagnesi
Alnicole farineuse	<i>Alnicola inculta</i> (Peck) Singer
Alnicole inondable	<i>Alnicola badiolateritia</i> (P.D. Orton) Courtecuisse
Alnicole jaunâtre	<i>Alnicola escharoides</i> (Fr. : Fr.) Romagnesi
Alnicole laineuse	<i>Alnicola luteolofibrillosa</i> Kühner
Alnicole rougeâtre	<i>Alnicola scolecina</i> (Fr.) Romagnesi
Amadouvier	<i>Fomes fomentarius</i> (L. : Fr.) Fr.
Amanite à bulbe étoilé	<i>Amanita asteropus</i> Romagn.
Amanite à cocarde	<i>Amanita battarrae</i> (Boud.) Bon (syn. <i>Am. umbrinolutea</i> s. auct.)
Amanite à lames saumon	<i>Amanita boudieri</i> var. <i>beillei</i> (Beauseigneur) Kühner & Romagnesi ex Neville & Poumarat
Amanite à pied court	<i>Amanita curtipes</i> E. J. Gilbert
Amanite à voile jaune	<i>Amanita franchetii</i> (Boudier) Fayod
Amanite à volve épaisse	<i>Amanita pachyvolvata</i> (M. Bon) G.J. Krieglsteiner
Amanite à volve grise	<i>Amanita submembranacea</i> (M. Bon) Gröger
Amanite à volve rousse	<i>Amanita proxima</i> Dumée
Amanite arctique	<i>Amanita arctica</i> Bas, T. Knudsen et Borgen
Amanite argentée	<i>Amanita mairei</i> Foley (syn. <i>Am. argentea</i>)
Amanite baie	<i>Amanita badia</i> (Schæff.) Bon et Contu
Amanite blanc de lait	<i>Amanita lactea</i> Malençon, Romagnesi & Reid
Amanite citrine	<i>Amanita citrina</i> (J.C. Sch.) Pers.
Amanite citrine blanche	<i>Amanita citrina</i> f. <i>alba</i> (Price) Quélet
Amanite compacte	<i>Amanita ponderosa</i> Malençon & Heim
Amanite de Codina	<i>Amanita codinae</i> (R. Maire) Bertault
Amanite de Vittadini	<i>Amanita vittadini</i> (Moretti) Vitt.
Amanite des aulnes	<i>Amanita friabilis</i> (P. Karsten) Bas
Amanite des Césars / Oronge	<i>Amanita caesarea</i> (Scop. : Fr.) Pers.
Amanite des dunes	<i>Amanita dunensis</i> (Heim) ex M. Bon & Andary
Amanite des eucalyptus	<i>Amanita heterochroma</i> Curreli
Amanite des montagnes	<i>Amanita oreina</i> (J. Favre) Heim ex M. Bon
Amanite des neiges	<i>Amanita nivalis</i> (Greville) Saccardo
Amanite des prairies	<i>Amanita singeri</i> Bas
Amanite élevée	<i>Amanita excelsa</i> (Fr. : Fr.) Bertillon (syn. <i>Am. ampla</i> Pers. : Fr.)
Amanite épaisse	<i>Amanita excelsa</i> var. <i>spissa</i> (Fr.) Neville & Poumarat
Amanite épineuse	<i>Amanita echinocephala</i> (Vittadini) Quélet (syn. <i>Am. solitaria</i>)
Amanite fausse-lépiote	<i>Amanita lepiotoides</i> Barla
Amanite fausse-royale	<i>Amanita pseudoregalis</i> Pluvinage
Amanite fauve	<i>Amanita fulva</i> (J.C. Sch. ?) Fr.
Amanite gracile	<i>Amanita gracilior</i> Bas et Honrubia
Amanite impériale	<i>Amanita ceciliae</i> (Berk. et Broome) Boudier (syn. <i>Am. inaurata</i> Gillet, <i>strangulata</i> (Fr.) Saccardo)
Amanite isabelle	<i>Amanita eliae</i> Quélet
Amanite jonquille	<i>Amanita junquillea</i> Quélet (syn. <i>Am. gemmata</i> (Paulet) Bertillon)
Amanite livide	<i>Amanita lividopallescens</i> (Secrétan ex Gillet) Bigeard & Guillemain
Amanite martelée	<i>Amanita malleata</i> (Piane ex M. Bon) Contu
Amanite noisette	<i>Amanita beckeri</i> Huijsman
Amanite ovoïde	<i>Amanita ovoidea</i> (Bull. : Fr.) Link
Amanite panthère	<i>Amanita pantherina</i> (de Candolle : Fr.) Krombholz
Amanite phalloïde	<i>Amanita phalloides</i> (Fr. : Fr.) Link
Amanite phalloïde blanche	<i>Amanita phalloides</i> var. <i>alba</i> Costantin & Dufour
Amanite plantoir	<i>Amanita gilbertii</i> Beauseign.

Noms français retenus	Noms latins
Amanite porphyre	<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schw. : Fr.
Amanite printanière	<i>Amanita verna</i> (Bull. : Fr.) Lamarck
Amanite robuste	<i>Amanita ponderosa</i> f. <i>valens</i> (E.-J. Gilbert) Neville & Poumarat
Amanite rougissante / Golmotte	<i>Amanita rubescens</i> (Pers. : Fr.) Pers.
Amanite safran	<i>Amanita crocea</i> (Quélet) Singer
Amanite solitaire	<i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet ex Vittadini) Bertillon
Amanite tigrée	<i>Amanita lividopallescens</i> var. <i>tigrina</i> Romagnesi ex M. Bon
Amanite toupie	<i>Amanita boudieri</i> Barla (syn. <i>Am. baccata</i> (Fr.) Gillet)
Amanite trompeuse	<i>Amanita decipiens</i> (Trimbach) Jacquetant
Amanite tue-mouches / Fausse orange	<i>Amanita muscaria</i> (L. : Fr.) Lamarck
Amanite tue-mouches dorée	<i>Amanita muscaria</i> var. <i>aureola</i> (Kalchbrenner) Quélet
Amanite vaginée / Grisette	<i>Amanita vaginata</i> (Bull. : Fr.) Vittadini
Amanite vireuse	<i>Amanita virosa</i> Lamarck
Anthurus étoilé	<i>Clathrus archeri</i> (Berk.) Dring
Argouane des prés	<i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karsten
Armillaire à voile jaune	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi
Armillaire boréale	<i>Armillaria borealis</i> Marxmüller & Korhonen
Armillaire couleur de miel	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl. : Fr.) Kummer
Armillaire des tourbières	<i>Armillaria ectypa</i> (Fr. : Fr.) Emel
Armillaire impériale	<i>Catathelasma imperiale</i> (Fr. → Quélet) Singer
Armillaire obscure	<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagnesi) Herink
Armillaire pied-bot	<i>Armillaria cepistipes</i> Velenovsky
Armillaire sans anneau	<i>Armillaria socialis</i> (de Candolle : Fr.) Herink
Bolbitie délicate	<i>Bolbitius tener</i> Berk. & Br.
Bolbitie jaune d'œuf	<i>Bolbitius titubans</i> (Bull. : Fr.) Fr.
Bolbitie olivacée	<i>Bolbitius variicolor</i> G.F. Atkinson
Bolbitie réticulée	<i>Bolbitius reticulatus</i> (Pers. : Fr.) Ricken
Bolet amer	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten
Bolet élégant	<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch : Fr.) Singer
Bolet hybride	<i>Suillus bresadolae</i> (Quélet) Gerhold
Bolet ivoire	<i>Suillus placidus</i> (Bonorden) Singer
Bolet ramoneur	<i>Leccinum variicolor</i> Watling
Bolet à base rose	<i>Suillus collinitus</i> (Fr.) O. Kuntze
Bolet à beau pied	<i>Boletus calopus</i> Pers. : Fr.
Bolet à chair jaune	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quélet
Bolet à pied creux	<i>Boletinus cavipes</i> (Opatowski) Kalchbrenner
Bolet à pied rouge	<i>Boletus erythropus</i> Pers. : Fr.
Bolet abricot	<i>Xerocomus armeniacus</i> (Quélet) Quélet
Bolet appendiculé	<i>Boletus appendiculatus</i> J.C. Sch. : Fr.
Bolet bai	<i>Xerocomus badius</i> (Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilbert
Bolet blafard	<i>Boletus luridus</i> J.C. Sch. : Fr.
Bolet blanc des marais	<i>Leccinum holopus</i> (Rostkovius) Watling
Bolet californien	<i>Xerocomus dryophilus</i> (Thiers) Singer
Bolet châtain	<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull. : Fr.) Quélet
Bolet chauve	<i>Boletus depilatus</i> Redeuilh
Bolet chicorée	<i>Boletus legaliae</i> (Pilát) ex Pilát & Dermek (syn. <i>B. satanoides</i> pp.)
Bolet commun	<i>Xerocomus communis</i> (Bull.) M. Bon
Bolet couleur de pêche	<i>Xerocomus persicolor</i> Engel, Klofac, H. Grünert & R. Grünert
Bolet cramois	<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quélet) Pouzar
Bolet craquelé	<i>Leccinum crocipodium</i> (Letellier) Watling
Bolet cuivré	<i>Boletus luteocupreus</i> Bertéa et Estades
Bolet de Bellini	<i>Suillus bellinii</i> (Inzenga) O. Kuntze

Noms français retenus	Noms latins
Bolet de Corse	<i>Leccinum corsicum</i> (Rolland) Singer
Bolet de Dupain	<i>Boletus dupainii</i> Boudier
Bolet de loup	<i>Boletus lupinus</i> Fr.
Bolet de plomb	<i>Boletus torosus</i> Fr.
Bolet de Quélet	<i>Boletus queletii</i> Schulzer von Muggenburg
Bolet de Sibérie	<i>Suillus sibiricus</i> (Singer) Singer
Bolet délaissé.	<i>Boletus aemilii</i> Barbier
Bolet dépoli	<i>Boletus impolitus</i> Fr.
Bolet des bords de mares	<i>Xerocomus ripariellus</i> Redeuilh
Bolet des bouviers	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel
Bolet des chênes verts	<i>Leccinum lepidum</i> (Bouchet) M. Bon & Contu
Bolet des sables	<i>Gyroporus ammophilus</i> (M.L. Castro & Freire) M.L. Castro & Freire
Bolet des sapins	<i>Boletus subappendiculatus</i> Dermek, Lazebnicek & Veselský
Bolet du Trentin	<i>Suillus tridentinus</i> (Bresadola) Singer
Bolet faux royal	<i>Boletus pseudoregius</i> (Hubert) ex Estades
Bolet ferrugineux	<i>Xerocomus ferrugineus</i> (J.C. Sch.) M. Bon
Bolet fissuré	<i>Xerocomus porosporus</i> Imler ex Imler
Bolet framboise	<i>Xerocomus rubellus</i> Quélet
Bolet granulé	<i>Suillus granulatus</i> (L. : Fr.) Roussel
Bolet gris des mélèzes	<i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel
Bolet indigotier	<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull. : Fr.) Quélet
Bolet jaunâtre	<i>Suillus flavidus</i> (Fr. : Fr.) Presl
Bolet jaune et bleu	<i>Boletus xanthocyaneus</i> (Romain) ex Romagnesi
Bolet jaune lion	<i>Xerocomus leonis</i> (D.A. Reid) M. Bon
Bolet joli	<i>Boletus pulchrotinctus</i> Alessio
Bolet jonquille	<i>Boletus erythropus</i> var. <i>junquilleus</i> (Quélet) M. Bon
Bolet larmoyant	<i>Suillus plorans</i> (Rolland) O. Kuntze
Bolet lignicole	<i>Buchwaldoboletus lignicola</i> (Kallenbach) Pilát (syn. <i>Pulveroboletus lignicola</i>)
Bolet livide	<i>Gyrodon lividus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten
Bolet magnifique	<i>Boletus permagnificus</i> Pöder
Bolet méditerranéen	<i>Suillus mediterraneensis</i> (Jacquetant & Blum) Redeuilh
Bolet mou	<i>Leccinum molle</i> (M. Bon) M. Bon
Bolet moucheté	<i>Suillus variegatus</i> (Swartz : Fr.) Richon & Roze
Bolet nain	<i>Chalciporus amarellus</i> (Quélet) Bataille
Bolet odorant	<i>Boletus fragrans</i> Vittadini
Bolet orangé	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.) S.F. Gray
Bolet orangé des chênes	<i>Leccinum quercinum</i> Pilát & Dermek
Bolet pâle	<i>Boletus fechtneri</i> Velenovsky
Bolet parasite	<i>Pseudoboletus parasiticus</i> (Bull. : Fr.) Šutara (syn. <i>Xerocomus parasiticus</i>)
Bolet poivré	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.: Fr.) Bataille
Bolet polychrome	<i>Boletus poikilochromus</i> Pöder, Cetto et Zuccher.
Bolet pomme de pin	<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop. : Fr.) Berk.
Bolet porphyre	<i>Porphyrellus porphyrosporus</i> (Fr.) E. J. Gilbert
Bolet pruineux	<i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr.) Quélet
Bolet pulvérulent	<i>Boletus pulverulentus</i> Opatowski
Bolet radicaire	<i>Boletus radicans</i> Pers. : Fr. (syn. <i>B. albidus</i>)
Bolet renard	<i>Leccinum vulpinum</i> Watling
Bolet rouge et jaune	<i>Boletus rhodoxanthus</i> (Krombholz) Kallenbach
Bolet rouge sang	<i>Boletus rubrosanguineus</i> (Walty) ex Cheype
Bolet roux	<i>Leccinum floccopus</i> (E.-J. Gilbert) Redeuilh

Noms français retenus	Noms latins
Bolet royal	<i>Boletus regius</i> Krombholz
Bolet rubis	<i>Chalciporus rubinus</i> (W.G. Smith) Singer
Bolet rude	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull. : Fr.) S.F. Gray
Bolet rude à base bleue	<i>Leccinum cyaneobasileucum</i> Lannoy et Estades
Bolet rude à chair rose	<i>Leccinum roseofractum</i> Watling
Bolet rude couleur de noix	<i>Leccinum nucatum</i> Lannoy et Estades
Bolet rude des charmes	<i>Leccinum carpini</i> (R. Schulz) Moser ex D.A. Reid
Bolet rude des trembles	<i>Leccinum duriusculum</i> (Schulzer von Muggenburg) Singer
Bolet rude gris-brun	<i>Leccinum brunneogriseolum</i> Lannoy et Estades
Bolet rude panaché	<i>Leccinum pulchrum</i> Lannoy et Estades
Bolet Satan	<i>Boletus satanas</i> Lenz
Bolet tomenteux	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L. : Fr.) Quélet
Bolet vieux rose	<i>Boletus rhodopurpureus</i> Smotlacha
Calocère petite-corne	<i>Calocera cornea</i> (Batsch : Fr.) Fr.
Calocère visqueuse	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.
Cèpe blanc	<i>Boletus edulis</i> var. <i>albus</i> (Pers.) E.-J. Gilbert
Cèpe bronzé / Tête-de-nègre	<i>Boletus aereus</i> Bull. : Fr.
Cèpe citron	<i>Boletus edulis</i> var. <i>citrinus</i> (Venturi ?) E.-J. Gilbert
Cèpe de Bordeaux	<i>Boletus edulis</i> Bull. : Fr.
Cèpe de la Mâmora	<i>Boletus mamorensis</i> Redeuilh
Cèpe des bouleaux	<i>Boletus edulis</i> f. <i>betulicola</i> Vassilkov
Cèpe des pins	<i>Boletus pinophilus</i> Pilát et Dermek
Cèpe d'été	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr. (syn. <i>B. reticulatus</i>)
Champignon de Paris	<i>Agaricus bisporus</i> var. <i>albidus</i> (J. E. Lange) Singer
Champignon de Paris, forme sauvage	<i>Agaricus bisporus</i> (J. E. Lange) Imbach
Chanterelle cendrée	<i>Craterellus cinereus</i> (Pers. : Fr.) Fr.
Chanterelle en tube	<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet
Chanterelle jaune	<i>Craterellus lutescens</i> (Pers. : Fr.) Fr.
Chanterelle jaune et violette	<i>Craterellus ianthinoxanthus</i> (R. Maire) Pérez-de-Gregorio
Chanterelle noirissante	<i>Craterellus melanoxeros</i> (Desmazières : Fr.) Pérez-de-Gregorio
Chanterelle sinueuse	<i>Craterellus sinuosus</i> (Fr. : Fr.) Fr. (syn. <i>Cr. undulatus</i>)
Chanterelle violette	<i>Gomphus clavatus</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray
Clathre à colonnes	<i>Colus hirudinosus</i> Cavalier & Séchier
Clathre rouge	<i>Clathrus ruber</i> [Micheli] : Pers.
Clavaire à pied fin	<i>Clavaria tenuipes</i> Berk. & Br.
Clavaire aiguë	<i>Clavaria acuta</i> Sow. : Fr.
Clavaire anisée	<i>Ramaria gracilis</i> (Pers. : Fr.) Quélet
Clavaire argilacée	<i>Clavaria argillacea</i> Pers. : Fr.
Clavaire aux yeux verts	<i>Ramaria apiculata</i> (Fr. : Fr.) Donk
Clavaire bifide	<i>Clavulinopsis dichotoma</i> (Godey) Corner
Clavaire bifurquée	<i>Ramariopsis kunzei</i> (Fr. : Fr.) Corner
Clavaire cendrée	<i>Clavulina cinerea</i> (Bull. : Fr.) J. Schröter
Clavaire chou-fleur	<i>Ramaria botrytis</i> (Pers. : Fr.) Ricken
Clavaire cornue	<i>Clavulinopsis corniculata</i> (J.C. Sch. : Fr.) Corner
Clavaire couleur de glace	<i>Lentaria afflata</i> (Lagger) Corner
Clavaire crêtée	<i>Clavulina coralloides</i> (L. : Fr.) J. Schröter
Clavaire de Daulnoy	<i>Clavaria daulnoyae</i> Quélet
Clavaire de la Manche	<i>Clavaria corbierei</i> Bourdot & Galzin
Clavaire déformée	<i>Ramaria rielii</i> Boudier
Clavaire des conifères	<i>Ramaria abietina</i> (Pers. : Fr.) Quélet
Clavaire des graviers	<i>Ramaria roellinii</i> Schild
Clavaire des sapinières	<i>Ramaria largentii</i> Marr & Stuntz

Noms français retenus	Noms latins
Clavaire des sphaignes	<i>Clavaria argillacea</i> var. <i>sphagnicola</i> (Boudier) Corner
Clavaire d'été	<i>Clavaria aestivalis</i> Romagnesi
Clavaire dorée	<i>Ramaria aurea</i> (J.C. Sch.) Quélet
Clavaire dressée	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet
Clavaire élastique	<i>Ramaria flaccida</i> (Fr. : Fr.) Bourdot
Clavaire en chandelier	<i>Clavicornia pyxidata</i> (Pers. : Fr.) Doty
Clavaire en fuseau	<i>Clavulinopsis fusiformis</i> (Sow. : Fr.) Corner
Clavaire en pilon	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L. : Fr.) Donk
Clavaire filiforme	<i>Macrotyphula juncea</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Berthier
Clavaire fistuleuse	<i>Macrotyphula fistulosa</i> (Holmskjold : Fr.) R.H. Petersen
Clavaire fuligineuse	<i>Clavaria fumosa</i> Pers. : Fr.
Clavaire gris-bleu	<i>Clavaria greletii</i> Boudier
Clavaire jaunâtre	<i>Ramaria flavescens</i> (J.C. Sch.) R.H. Petersen
Clavaire jaune	<i>Ramaria flava</i> (J.C. Sch. : Fr.) Quélet
Clavaire jaune paille	<i>Clavaria straminea</i> Cotton
Clavaire jaune pâle	<i>Clavulinopsis luteoalba</i> (Rea) Corner
Clavaire jolie	<i>Ramaria formosa</i> (Pers. : Fr.) Quélet
Clavaire joyeuse	<i>Clavulinopsis laeticolor</i> (Berk. & Br.) R.H. Petersen
Clavaire lignicole	<i>Lentaria subcaulescens</i> (Rebentisch : Fr.) S. Rauschert
Clavaire lilacine	<i>Ramariopsis pulchella</i> (Boudier) Corner
Clavaire lumineuse	<i>Clavulinopsis helvola</i> (Pers. : Fr.) Corner
Clavaire mimétique	<i>Ramaria neoformosa</i> R.H. Petersen
Clavaire noircissante	<i>Ramaria broomei</i> (Cotton & Wakefield) R. H. Petersen
Clavaire obscurcie	<i>Clavulinopsis umbrinella</i> (Saccardo) Corner
Clavaire obtuse	<i>Ramaria schildii</i> R.H. Petersen
Clavaire ocre jaune	<i>Clavulinopsis luteoochracea</i> (Cavara) Corner
Clavaire pâle	<i>Ramaria pallida</i> (J.C. Sch.) Ricken
Clavaire palmée des conifères	<i>Ramaria eumorpha</i> (P. Karsten) Corner
Clavaire petite langue	<i>Clavariadelphus ligula</i> (J.C. Sch. : Fr.) Donk
Clavaire petite massue	<i>Clavicornia taxophila</i> (Thom) Doty
Clavaire rose	<i>Clavaria rosea</i> Dalman : Fr.
Clavaire rouge corail	<i>Ramaria subbotrytis</i> (Coker) Corner
Clavaire rougeâtre	<i>Ramaria rubella</i> (J.C. Sch. →) R.H. Petersen
Clavaire rougissante	<i>Ramaria bataillei</i> (R. Maire) Corner
Clavaire rugueuse	<i>Clavulina rugosa</i> (Bull. : Fr.) J. Schröter
Clavaire safran	<i>Ramariopsis crocea</i> (Pers. : Fr.) Corner
Clavaire sanguine	<i>Ramaria eurosanguinea</i> Courtecuisse, nov. nom.
Clavaire saumonée	<i>Clavaria incarnata</i> Weinmann
Clavaire tendre	<i>Lentaria delicata</i> (Fr. : Fr.) Corner
Clavaire tronquée	<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quélet) Donk
Clavaire variable	<i>Ramaria fennica</i> (P. Karsten) Ricken
Clavaire verdissante	<i>Ramaria ochraceovirens</i> (Junghuhn : Fr.) Donk
Clavaire vermicelle	<i>Clavaria fragilis</i> Holmskjold : Fr.
Clavaire violette	<i>Clavaria zollingeri</i> Lévillé
Clitocybe à bonne odeur	<i>Clitocybe amoenolens</i> Malençon
Clitocybe à ceinture blanche	<i>Gerronema subspadiceum</i> (J.E. Lange) M. Bon
Clitocybe à centre brun	<i>Clitocybe metachroa</i> (Fr. : Fr.) Kummer
Clitocybe à guttules	<i>Lepista gilva</i> (Pers. : Fr.) Roze
Clitocybe à odeur de poisson	<i>Clitocybe inornata</i> (Sow. : Fr.) Gillet
Clitocybe à odeur de poulailler	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper
Clitocybe à pied comprimé	<i>Pseudoomphalina graveolens</i> (S. Petersen) Singer ex Contu & La Rocca
Clitocybe à pied en massue	<i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo

Noms français retenus	Noms latins
	& Vilgalys
Clitocybe à rhizomorphes	<i>Clitocybe vermicularis</i> (Fr.) Kummer
Clitocybe absinthe	<i>Pseudoomphalina absinthiata</i> (Lasch : Fr.) Knudsen
Clitocybe anisé des feuilles	<i>Clitocybe phyllophila</i> var. <i>ornamentalis</i> (Velenovsky) Raitelhuber
Clitocybe anisé pâle	<i>Clitocybe suaveolens</i> (Schum. : Fr.) Kummer
Clitocybe anisé rosâtre	<i>Clitocybe obsoleta</i> (Batsch : Fr.) Quélet
Clitocybe anisé strié	<i>Clitocybe fragrans</i> (With. : Fr.) Kummer
Clitocybe bicolore	<i>Clitocybe decembris</i> Singer
Clitocybe blanchi	<i>Clitocybe dealbata</i> (Sow. : Fr.) Kummer
Clitocybe blanchissant	<i>Clitocybe candicans</i> (Pers. : Fr.) Kummer
Clitocybe cérusé	<i>Clitocybe cerussata</i> (Fr. : Fr.) Kummer (syn. <i>C. pithyophila</i>)
Clitocybe côtelé	<i>Clitocybe costata</i> Kühner & Romagnesi ex Kühner & Romagnesi
Clitocybe de Bresadola	<i>Clitocybe bresadolana</i> Singer ex M. Bon
Clitocybe de mars	<i>Clitocybe pruinosa</i> (Lasch) Kummer
Clitocybe des feuilles	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers. : Fr.) Kummer
Clitocybe des Marti	<i>Lepista martiorum</i> (J. Favre) M. Bon
Clitocybe des pelouses	<i>Clitocybe graminicola</i> M. Bon
Clitocybe du bord des routes	<i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers. : Fr.) Kummer
Clitocybe en coupe	<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull. : Fr.) Singer
Clitocybe en entonnoir	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers. : Fr.) Kummer
Clitocybe en touffes	<i>Lyophyllum connatum</i> (Schum. : Fr.) Singer
Clitocybe en trompette	<i>Clitocybe lituus</i> (Fr.) Métrod
Clitocybe farineux	<i>Clitocybe ditopa</i> (Fr. : Fr.) Gillet
Clitocybe faux-squamuleux	<i>Clitocybe squamulosoides</i> P.D. Orton
Clitocybe fétide	<i>Clitocybe foetens</i> Melot
Clitocybe feuille de tomate	<i>Clitocybe houghtonii</i> (W. Phillips) Dennis
Clitocybe géotrope	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bull. : Fr.) Quélet
Clitocybe hivernal	<i>Clitocybe brumalis</i> (Fr. : Fr.) Kummer
Clitocybe inversé	<i>Lepista inversa</i> (Scop. : Fr.) Patouillard
Clitocybe inversé des feuillus	<i>Lepista flaccida</i> (Sow. : Fr.) Patouillard
Clitocybe moisi	<i>Clitocybe vibecina</i> (Fr. : Fr.) Quélet
Clitocybe nébuleux	<i>Lepista nebularis</i> (Batsch : Fr.) Harmaja
Clitocybe nébuleux blanc	<i>Lepista nebularis</i> f. <i>alba</i> (J. E. Lange)
Clitocybe nitreux	<i>Clitocybe nitriolens</i> J. Favre
Clitocybe odorant	<i>Clitocybe odora</i> (Bull. : Fr.) Kummer
Clitocybe odorant blanc	<i>Clitocybe odora</i> f. <i>alba</i> J.E. Lange
Clitocybe ombiliqué	<i>Clitocybe umbilicata</i> (J.C. Sch. ?) Kummer
Clitocybe pâlassant	<i>Pseudoclitocybe expallens</i> (Pers. : Fr.) Moser
Clitocybe petite souris	<i>Clitocybe font-queri</i> Heim
Clitocybe plombé	<i>Clitocybe alexandri</i> (Gillet) Gillet
Clitocybe rosé	<i>Clitocybe diatreta</i> (Fr. : Fr.) Kummer
Clitocybe squamuleux	<i>Clitocybe squamulosa</i> (Pers. : Fr.) Kummer
Clitocybe terre cuite	<i>Clitocybe sinopica</i> (Fr. : Fr.) Kummer
Clitopile aplati	<i>Clitopilus pinsitus</i> (Fr. : Fr.) Jossierand
Clitopile du fumier	<i>Clitopilus passekerianus</i> (Pilát) Singer [<i>inval.</i>]
Clitopile gobelet	<i>Clitopilus scyphoides</i> (Fr. : Fr.) Singer
Clitopile omphale	<i>Clitopilus omphaliformis</i> Jossierand
Clitopile sessile	<i>Clitopilus hobsonii</i> (Berk.) P.D. Orton
Collybie à lames jaunes	<i>Callistosporium xanthophyllum</i> (Malençon & Bertault) ex M. Bon
Collybie à lames larges	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar
Collybie à pied en fuseau	<i>Collybia fusipes</i> (Bull. : Fr.) Quélet
Collybie à pied rouge	<i>Collybia erythropus</i> (Pers. : Fr.) Kummer
Collybie à pied tordu	<i>Collybia prolixa</i> var. <i>distorta</i> (Fr.) P. Roux

Noms français retenus	Noms latins
Collybie à pied velouté	<i>Flammulina velutipes</i> (Curt. : Fr.) P. Karsten
Collybie à poils noirs	<i>Xerula melanotricha</i> Dörfelt
Collybie à poils ras	<i>Xerula pudens</i> (Pers. : Fr.) Singer
Collybie à sclérote jaune	<i>Microcollybia cookei</i> (Bresadola) Lennox
Collybie à sclérote noir	<i>Microcollybia tuberosa</i> (Bull. : Fr.) Métrod
Collybie ambrée	<i>Collybia ocior</i> (Pers.) Vilgalys et O. K. Miller
Collybie aqueuse	<i>Collybia aquosa</i> (Bull. : Fr.) Kummer
Collybie beurrée	<i>Collybia butyracea</i> (Bull. : Fr.) Kummer
Collybie bouton d'or	<i>Rugosomyces chrysenteron</i> (Bull. : Fr.) M. Bon
Collybie carnée	<i>Rugosomyces carneus</i> (Bull. : Fr.) M. Bon
Collybie charbonnière	<i>Tephrocye anthracophila</i> (Lasch) P.D. Orton
Collybie couleur de pêche	<i>Rugosomyces persicolor</i> (Fr.) M. Bon
Collybie des chênes	<i>Collybia dryophila</i> (Bull. : Fr.) Kummer
Collybie des cônes d'épicéa	<i>Strobilurus esculentus</i> (Wulfen : Fr.) Singer
Collybie des cônes de pin	<i>Strobilurus stephanocystis</i> (Kühner & Romagnesi ex Hora) Singer
Collybie des friches	<i>Tephrocye tesquorum</i> (Fr.) Moser
Collybie des hêtres	<i>Collybia fagiphila</i> Velenovsky
Collybie des marais	<i>Tephrocye palustris</i> (Peck) Donk
Collybie des neiges	<i>Collybia verna</i> Ryman
Collybie des pelouses	<i>Tephrocye graminicola</i> M. Bon
Collybie des sols brûlés	<i>Tephrocye ambusta</i> (Fr. : Fr.) Donk
Collybie en touffes	<i>Collybia confluens</i> (Pers. : Fr.) Kummer
Collybie fétide	<i>Collybia impudica</i> (Fr.) Singer
Collybie fouisseuse	<i>Collybia fodiens</i> (Kalchbrenner) Konrad & Maublanc
Collybie gris carné	<i>Tephrocye tylicolor</i> (Fr. : Fr.) Moser
Collybie guêtrée	<i>Collybia peronata</i> (Bolt. : Fr.) Kummer
Collybie hybride	<i>Collybia hybrida</i> (Kühner & Romagnesi) Svrcek & Kubicka
Collybie lacérée	<i>Clitocybula lacerata</i> (Scop.) Métrod ex Singer
Collybie maculée	<i>Collybia maculata</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer
Collybie moisie	<i>Tephrocye mephitica</i> (Fr.) Moser
Collybie mycophage	<i>Microcollybia cirrhata</i> (Pers.) Métrod
Collybie négligée	<i>Tephrocye ozes</i> (Fr.) M. Bon
Collybie noirâtre	<i>Tephrocye atrata</i> (Fr. : Fr.) Donk
Collybie obscure	<i>Rugosomyces obscurissimus</i> (A. Pearson) M. Bon
Collybie peignée	<i>Collybia filamentosa</i> Velenovsky
Collybie poudrée	<i>Tephrocye boudieri</i> (Kühner & Romagnesi) Derbsch
Collybie pourpre et or	<i>Rugosomyces onychinus</i> (Fr.) Raithelhuber
Collybie pourprée	<i>Collybia fuscopurpurea</i> (Pers. : Fr.) Kummer
Collybie queue de souris	<i>Baeospora myosura</i> (Fr. : Fr.) Singer
Collybie radicante	<i>Xerula radicata</i> (Rehl. : Fr.) Dörfelt
Collybie rameuse	<i>Dendrocollybia racemosa</i> (Pers. : Fr.) R.H. Petersen & S. A. Redhead
Collybie rance	<i>Tephrocye rancida</i> (Fr. : Fr.) Donk
Collybie striée	<i>Tephrocye striaepilea</i> (Fr.) Donk
Collybie tenace	<i>Strobilurus tenacellus</i> (Pers. : Fr.) Singer
Collybie violette	<i>Rugosomyces ionides</i> (Bull. : Fr.) M. Bon
Collybie visqueuse	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrad. : Fr.) von Höhnelt
Conocybe à pied blanc	<i>Conocybe apala</i> (Fr. : Fr.) Arnolds
Conocybe brunâtre	<i>Conocybe brunneola</i> (Kühner) ex Kühner & Watling
Conocybe bulbeux	<i>Conocybe inocybeoides</i> Watling
Conocybe commun	<i>Conocybe tenera</i> (J.C. Sch. : Fr.) Fayod
Conocybe des dunes	<i>Conocybe dunensis</i> T.J. Wallace
Conocybe doigt de gant	<i>Conocybe conocephala</i> (Bull. : Fr.) M. Bon

Noms français retenus	Noms latins
Conocybe radicans	<i>Conocybe antipus</i> (Lasch : Fr.) Fayod
Coprin à fausse volve	<i>Coprinus ellisii</i> P.D. Orton
Coprin à feutre roux	<i>Coprinus radians</i> (Desmazières : Fr.) Fr.
Coprin à odeur de bitume	<i>Coprinus narcoticus</i> (Batsch : Fr.) Fr.
Coprin à tête rouge	<i>Coprinus erythrocephalus</i> (Léveillé) Fr.
Coprin à voile jaune	<i>Coprinus xanthothrix</i> Romagnesi
Coprin annelé	<i>Coprinus sterquilinus</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Coprin blanc de neige	<i>Coprinus niveus</i> (Pers. : Fr.) Fr.
Coprin cendré	<i>Coprinus cinereus</i> (J.C. Sch. : Fr.) S.F. Gray
Coprin chauve	<i>Coprinus insignis</i> Peck
Coprin chevelu	<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müller : Fr.)
Coprin des charbonnières	<i>Coprinus angulatus</i> Peck (syn. <i>C. boudieri</i>)
Coprin des chaumes	<i>Coprinus friesii</i> Quélet
Coprin des joncs	<i>Coprinus martinii</i> J. Favre ex P.D. Orton
Coprin des oyats	<i>Coprinus ammophilae</i> Courtecuisse
Coprin domestique	<i>Coprinus domesticus</i> (Bolt. : Fr.) S.F. Gray
Coprin doré	<i>Coprinus auricomus</i> Patouillard
Coprin du peuplier	<i>Coprinus strossmayeri</i> Schulzer von Müggenburg
Coprin glabre	<i>Coprinus leiocephalus</i> P.D. Orton
Coprin grégaire	<i>Coprinus disseminatus</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray
Coprin gris souris	<i>Coprinus laanii</i> Kits van Waveren
Coprin impatient	<i>Coprinus impatiens</i> (Fr. : Fr.) Quélet
Coprin laineux des charbonnières	<i>Coprinus phlyctidosporus</i> Romagnesi
Coprin micacé	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.:Fr.) Fr.
Coprin micacé à pied lisse	<i>Coprinus truncorum</i> (J.C. Sch.) Fr.
Coprin mini-pie	<i>Coprinus gonophyllus</i> Quélet
Coprin misérable	<i>Coprinus miser</i> P. Karsten
Coprin noir d'encre	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull. : Fr.) Fr.
Coprin noir d'encre pointu	<i>Coprinus acuminatus</i> (Romagnesi) P.D. Orton
Coprin parasol	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.:Fr.) Fr.
Coprin pie	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull. : Fr.) S.F. Gray
Coprin pied-de-lièvre	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr.:Fr.) Fr.
Coprin squamuleux	<i>Coprinus romagnesianus</i> Singer
Fausse-chanterelle des bruyères	<i>Cantharellula umbonata</i> (J.F. Gmel. : Fr.) Singer
Fausse-chanterelle des charbonnières	<i>Faerberia carbonaria</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Pouzar
Fausse-girolle	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen : Fr.) R. Maire
Fausse-girolle mouchetée	<i>Hygrophoropsis fuscusquamula</i> P. D. Orton
Faux clitocybe de l'olivier	<i>Omphalotus olearius</i> (de Candolle : Fr.) Fayod
Faux clitocybe lumineux	<i>Omphalotus illudens</i> (Schw. : Fr.) Saccardo
Ganoderme crevassé	<i>Ganoderma pfeifferi</i> Bresadola
Ganoderme du mélèze	<i>Ganoderma valesiacum</i> Boudier
Ganoderme du sapin	<i>Ganoderma carnosum</i> Patouillard
Ganoderme épaissi	<i>Ganoderma australe</i> (Fr. : Fr.) Patouillard
Ganoderme luisant	<i>Ganoderma lucidum</i> (W. Curtis : Fr.) P. Karsten
Ganoderme plat	<i>Ganoderma lipsiense</i> (Batsch) G.F. Atkinson
Ganoderme résineux	<i>Ganoderma resinaceum</i> Boudier
Girolle	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. : Fr.
Girolle abricot	<i>Cantharellus friesii</i> Quélet
Girolle améthyste	<i>Cantharellus amethysteus</i> (Quélet) Saccardo
Girolle du Midi	<i>Cantharellus lilacinopruinatus</i> Hermitte, Eyssartier & Poumarat
Girolle ferrugineuse	<i>Cantharellus ferruginascens</i> P. D. Orton
Girolle pruinuse	<i>Cantharellus subpruinus</i> Eyssartier & Buyck

Noms français retenus	Noms latins
Lactaire à ceinture rouge	<i>Lactarius rubrocinctus</i> Fr.
Lactaire à fossettes	<i>Lactarius scrobiculatus</i> (Scop. : Fr.) Fr.
Lactaire à lait abondant	<i>Lactarius volemus</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire à lait brûlant	<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull. : Fr.) Fr.
Lactaire à lait jaunissant	<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.
Lactaire à lames interveinées	<i>Lactarius acerrimus</i> Britzelmayer
Lactaire à odeur de céleri	<i>Lactarius helvus</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire à odeur de chicorée	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bull. : Fr.) Fr.
Lactaire à odeur de citron	<i>Lactarius citriolens</i> Pouzar
Lactaire à odeur de noix de coco	<i>Lactarius glyciosmus</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire à odeur de pomme	<i>Lactarius evosmus</i> Kühner et Romagnesi
Lactaire à odeur de punaise	<i>Lactarius quietus</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire à pied blanc	<i>Lactarius azonites</i> (Bull.) Fr.
Lactaire à poil ras	<i>Lactarius mairei</i> Malençon
Lactaire à toison	<i>Lactarius torminosus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Pers.
Lactaire âcre	<i>Lactarius acris</i> (Bolt. : Fr.) S.F. Gray
Lactaire blafard	<i>Lactarius luridus</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray
Lactaire brun	<i>Lactarius fuscus</i> Rolland
Lactaire brun-violet	<i>Lactarius robertianus</i> M. Bon
Lactaire cannelé	<i>Lactarius cremor</i> Fr.
Lactaire caoutchouc	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray
Lactaire cerclé	<i>Lactarius circellatus</i> Fr.
Lactaire chagriné	<i>Lactarius subumbonatus</i> Lindgren
Lactaire chiffonné	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.
Lactaire cireux	<i>Lactarius hyssiginus</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire citron pâle	<i>Lactarius aquizonatus</i> Kytövuori
Lactaire délicieux	<i>Lactarius deliciosus</i> (L. : Fr.) S.F. Gray
Lactaire des aulnes verts	<i>Lactarius alpinus</i> Peck
Lactaire des bourbiers	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora
Lactaire des chênes verts	<i>Lactarius atlanticus</i> M. Bon
Lactaire des cistes	<i>Lactarius cistophilus</i> M. Bon & Trimbach
Lactaire des dryades	<i>Lactarius dryadophilus</i> Kühner
Lactaire des épicéas	<i>Lactarius deterrimus</i> Gröger
Lactaire des hauts-marais	<i>Lactarius scoticus</i> Berkeley et Broome
Lactaire des maquis	<i>Lactarius tesquorum</i> Malençon
Lactaire des mélèzes	<i>Lactarius porninsis</i> Rolland
Lactaire des peupliers	<i>Lactarius controversus</i> Pers. : Fr.
Lactaire des sapins	<i>Lactarius intermedius</i> (Fr.->) Cooke
Lactaire des saules	<i>Lactarius aspideus</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire des sphaignes	<i>Lactarius sphagneti</i> (Fr.) Neuhoff ex Gröger
Lactaire des tourbières	<i>Lactarius oedehyphosus</i> Izderda & Noordeloos
Lactaire enfumé	<i>Lactarius picinus</i> Fr.
Lactaire épineux	<i>Lactarius spinosulus</i> Quélet
Lactaire fané	<i>Lactarius vietus</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire fauve	<i>Lactarius fulvissimus</i> Romagnesi
Lactaire fauve orangé	<i>Lactarius aurantiofulvus</i> Blum ex M. Bon
Lactaire festonné	<i>Lactarius ruginosus</i> Romagnesi
Lactaire flamboyant	<i>Lactarius rugatus</i> Kühner et Romagnesi
Lactaire flexueux	<i>Lactarius flexuosus</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray
Lactaire fruité	<i>Lactarius bertillonii</i> (Neuhoff ex Z. Schaefer) M. Bon
Lactaire fuligineux	<i>Lactarius fuliginosus</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire glutineux	<i>Lactarius albocarneus</i> Britzelmayer
Lactaire gris des aulnes verts	<i>Lactarius lepidotus</i> Hesler & A.H. Smith

Noms français retenus	Noms latins
Lactaire hépatique	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright
Lactaire hépatique des aulnes verts	<i>Lactarius brunneohepaticus</i> Moser
Lactaire humide	<i>Lactarius uvidus</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire jaunâtre	<i>Lactarius flavidus</i> Boudier
Lactaire lilacin	<i>Lactarius lilacinus</i> (Lasch : Fr.) Fr.
Lactaire livide	<i>Lactarius ilicis</i> Sarnari
Lactaire méridional	<i>Lactarius mediterraneensis</i> Llistosella & Bellù
Lactaire muqueux	<i>Lactarius blennius</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire nain	<i>Lactarius nanus</i> J. Favre
Lactaire olivâtre	<i>Lactarius obscuratus</i> (Lasch : Fr.) Fr.
Lactaire ombiliqué	<i>Lactarius omphaliformis</i> Romagnesi
Lactaire orangé	<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray
Lactaire orangé gris	<i>Lactarius quieticolor</i> Romagnesi
Lactaire pâle	<i>Lactarius pallidus</i> Pers. : Fr.
Lactaire pâle des tourbières	<i>Lactarius musteus</i> Fr.
Lactaire parcheminé	<i>Lactarius pergamenus</i> (Swartz : Fr.) Fr.
Lactaire petite coupe	<i>Lactarius cyathuliformis</i> M. Bon
Lactaire petit-lait	<i>Lactarius serifluus</i> (de Candolle : Fr.) Fr.
Lactaire pisse-lait	<i>Lactarius fluens</i> Boudier
Lactaire plombé	<i>Lactarius necator</i> (Bull. : Fr.) Pers.
Lactaire poivré	<i>Lactarius piperatus</i> (L. : Fr.) Pers.
Lactaire pubescent	<i>Lactarius pubescens</i> (Schrad. →) Fr.
Lactaire remarquable	<i>Lactarius repraesentaneus</i> Britzelmayr
Lactaire ridulé	<i>Lactarius pterosporus</i> Romagnesi
Lactaire rouge sombre	<i>Lactarius badiosanguineus</i> Kühner et Romagnesi
Lactaire roux	<i>Lactarius rufus</i> (Scop. : Fr.) Fr.
Lactaire salissant	<i>Lactarius luteolus</i> Peck
Lactaire sanguin	<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr.
Lactaire saumon	<i>Lactarius salmonicolor</i> Heim et Leclair
Lactaire semi-sanguin	<i>Lactarius semisanguifluus</i> Heim & Leclair
Lactaire soyeux	<i>Lactarius britannicus</i> D.A. Reid
Lactaire très doux	<i>Lactarius mitissimus</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire très sombre	<i>Lactarius romagnesii</i> M. Bon
Lactaire trivial	<i>Lactarius trivialis</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire trompeur	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet
Lactaire velours	<i>Lactarius lignyotus</i> Fr.
Lactaire velouté	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire velouté à lait rosissant	<i>Lactarius vellereus</i> var. <i>hometii</i> (Gillet) Boudier
Lactaire verdissant	<i>Lactarius glaucescens</i> Crossland
Lactaire vineux	<i>Lactarius vinosus</i> (Quélet) Quélet
Lactaire violascent	<i>Lactarius violascens</i> (Otto : Fr.) Fr.
Lactaire zoné	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr.
Lactaire zoné de rose	<i>Lactarius flexuosus</i> var. <i>roseozonatus</i> von Post
Lactaire zoné des épicéas	<i>Lactarius zonarioides</i> Kühner & Romagnesi
Langue de boeuf	<i>Fistulina hepatica</i> (J.C. Sch. : Fr.) Withering
Lenzite baleine	<i>Lenzites warnieri</i> Durieu et Montagne
Lenzite des clôtures	<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen : Fr.) P. Karsten
Lenzite des poutres	<i>Gloeophyllum trabeum</i> (Pers. : Fr.) Murrill
Lenzite du bouleau	<i>Lenzites betulinus</i> (L. : Fr.) Fr.
Lenzite du chêne	<i>Daedalea quercina</i> (L. : Fr.) Pers.
Lenzite du sapin	<i>Gloeophyllum abietinum</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten
Lenzite septentrionale	<i>Daedaleopsis septentrionalis</i> (P. Karsten) Niemelä
Lenzite tricolore	<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer

Noms français retenus	Noms latins
Leucopaxille à odeur de poulailler	<i>Leucopaxillus paradoxus</i> (Costantin & Dufour) Boursier
Leucopaxille amer	<i>Leucopaxillus amarus</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Kühner
Leucopaxille blanc	<i>Leucopaxillus candidus</i> (Bresadola) Singer
Leucopaxille blanc et ocre	<i>Leucopaxillus alboalutaceus</i> (F.H. Møller) F.H. Møller
Leucopaxille blanc et rose	<i>Leucopaxillus rhodoleucus</i> (Romell) Kühner
Leucopaxille charnu	<i>Leucopaxillus lepistoides</i> (R. Maire) Singer
Leucopaxille craquelé	<i>Leucopaxillus cutesfractus</i> Noordeloos
Leucopaxille géant	<i>Leucopaxillus giganteus</i> (Leysser : Fr.) Singer
Leucopaxille tricolore	<i>Leucopaxillus compactus</i> (Fr. → Quélet) Neuhoff
Matsutake	<i>Tricholoma matsutake</i> S. Ito & Imai
Meunier	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop. : Fr.) Kummer
Meunier gris	<i>Clitopilus cystidiatus</i> Hausknecht & Noordeloos
Nonnette voilée	<i>Suillus luteus</i> (L. : Fr.) Roussel
Oreille de Judas	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull. : Fr.) Wettstein
Oreille poilue	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks. : Fr.) Pers.
Petit pied bleu	<i>Lepista sordida</i> (Schum. : Fr.) Singer
Phyllospore d'Europe	<i>Phylloporus pelletieri</i> (Léveillé) Quélet
Pied-bleu	<i>Lepista nuda</i> (Bull. : Fr.) Cooke
Pied-violet	<i>Lepista personata</i> (Fr. : Fr.) Cooke
Polypore à marge dorée	<i>Porodaedalea conchata</i> (Pers. : Fr.) Fiasson & Niemelä
Polypore à pied noir	<i>Polyporus melanopus</i> (Pers. : Fr.) Fr.
Polypore à sclérote	<i>Polyporus tuberaster</i> (Jacq. : Fr.) Fr.
Polypore alvéolé	<i>Polyporus arcularius</i> (Batsch : Fr.) Fr.
Polypore amer	<i>Postia stiptica</i> (Pers. : Fr.) Jülich
Polypore anisé	<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen : Fr.) Imazeki
Polypore bai	<i>Polyporus durus</i> (Timm) Kreisel
Polypore balsamique	<i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wahlenberg : Fr.) P. Karsten
Polypore bisannuel	<i>Abortiporus biennis</i> (Bulliard : Fr.) Singer
Polypore blanc de neige	<i>Tyromyces chioneus</i> (Fr. : Fr.) P. Karsten
Polypore blanchâtre	<i>Antrodia albida</i> (Fr. : Fr.) Donk
Polypore bleuté des conifères	<i>Postia caesia</i> (Schrad. : Fr.) P. Karsten
Polypore bleuté des feuillus	<i>Postia subcaesia</i> (A. David) Jülich
Polypore boréal	<i>Climacocystis borealis</i> (Fr. : Fr.) Kotlaba et Pouzar
Polypore cannelle	<i>Coltricia cinnamomea</i> (Jacq.) Murrill
Polypore champêtre	<i>Dichomitus campestris</i> (Quélet) Domanski et Orlicz
Polypore cilié	<i>Polyporus ciliatus</i> Fr. : Fr.
Polypore confluent	<i>Scutigera confluens</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Bondarzew & Singer
Polypore cotonneux	<i>Spongipellis spumeus</i> (Sow. : Fr.) Patouillard
Polypore craquelé	<i>Scutigera cristatus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Bondarzew & Singer
Polypore de l'argousier	<i>Phellinus hippophaecola</i> Jahn
Polypore de l'aulne	<i>Inonotus radiatus</i> (Sow. : Fr.) P. Karsten
Polypore de l'orme	<i>Rigidoporus ulmarius</i> (Sow. : Fr.) Imazeki
Polypore de Trog	<i>Podofomes trogii</i> (Fr.) Pouzar
Polypore de Tunisie	<i>Polyporus corylinus</i> Mauri
Polypore denté	<i>Spongipellis pachyodon</i> (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar
Polypore des brebis	<i>Scutigera ovinus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Murrill
Polypore des bruyères	<i>Perenniporia ochroleuca</i> (Berk.) Ryvarden
Polypore des cistes	<i>Polyporus meridionalis</i> (A. David) Jahn
Polypore des montagnes	<i>Bondarzewia mesenterica</i> (J.C. Sch.) Kreisel
Polypore des steppes	<i>Polyporus rhizophilus</i> Patouillard
Polypore des vergers	<i>Phellinus tuberculatus</i> (Baumgartner) Niemelä
Polypore d'hiver	<i>Polyporus brumalis</i> (Pers. : Fr.) Fr.
Polypore dressé	<i>Phellinus erectus</i> A. David, Dequatre & Fiasson

Noms français retenus	Noms latins
Polypore du bouleau	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten
Polypore du châtaignier	<i>Fomitopsis spraguei</i> (Berk. & Curt.) Gilbertson & Ryvarden
Polypore du frêne	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bull. : Fr.) Ryvarden
Polypore du groseillier	<i>Phylloporia ribis</i> (Schum. : Fr.) Ryvarden
Polypore du hêtre	<i>Inonotus nodulosus</i> (Fr.) Pilát
Polypore du mélèze	<i>Laricifomes officinalis</i> (Villars : Fr.) Kotlaba & Pouzar
Polypore du mûrier	<i>Polyporus alveolaris</i> (Bosc : Fr.) Fr.
Polypore du pin	<i>Porodaedalea pini</i> (Thore : Fr.) Murrill
Polypore du rond des pins	<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr. : Fr.) Brefeld
Polypore du sapin	<i>Phellinus hartigii</i> (Allescher & Schnabl) Patouillard
Polypore du saule	<i>Phellinus trivialis</i> (Bresadola) Kreisel
Polypore du tamaris	<i>Inonotus tamaricis</i> (Patouillard) R. Maire
Polypore écaillé	<i>Polyporus squamosus</i> (Huds. : Fr.) Fr.
Polypore en coussinet	<i>Postia ptychogaster</i> (F. Ludwig) Vesterholt
Polypore en fleur	<i>Postia floriformis</i> (Quélet) Jülich
Polypore en ombelle	<i>Dendropolyporus umbellatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich
Polypore en touffes	<i>Grifola frondosa</i> (Dicks. : Fr.) S.F. Gray
Polypore éponge	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr. : Fr.) Patouillard
Polypore fauve	<i>Onnia leporina</i> (Fr.) Jahn
Polypore faux-amadouvier	<i>Phellinus igniarius</i> (L. : Fr.) Quélet
Polypore ferrugineux	<i>Phellinus ferruginosus</i> (Schrad. : Fr.) Patouillard
Polypore ferrugineux des conifères	<i>Phellinus ferrugineofuscus</i> (P. Karsten) Bourdot
Polypore ferrugineux du chêne	<i>Phellinus ferreus</i> (Pers. : Fr.) Bourdot & Galzin
Polypore flamboyant	<i>Pycnoporellus fulgens</i> (Fr.) Donk
Polypore fragile	<i>Postia fragilis</i> (Fr. : Fr.) Jülich
Polypore géant	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten
Polypore hérissé	<i>Inonotus hispidus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten
Polypore incrusté	<i>Inonotus obliquus</i> (Pers. : Fr.) Pilát
Polypore larmoyant	<i>Inonotus dryadeus</i> (Pers. : Fr.) Murrill
Polypore lisse	<i>Phellinus laevigatus</i> (Fr. → P. Karsten) Bourdot & Galzin
Polypore marginé	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) P. Karsten
Polypore mie de pain	<i>Perenniporia medulla-panis</i> (Jacq. : Fr.) Donk
Polypore mou	<i>Leptoporus mollis</i> (Pers. : Fr.) Pilát
Polypore moucheté	<i>Polyporus lentus</i> Berk.
Polypore nain	<i>Polyporus leptocephalus</i> f. <i>nummularius</i> (Bull. : Fr.) Courtecuisse
Polypore nid d'abeilles	<i>Hexagonia nitida</i> Durieu & Montagne
Polypore noircissant	<i>Phellinus nigricans</i> (Fr. : Fr.) P. Karsten
Polypore osseux	<i>Osteina obducta</i> (Berk.) Donk
Polypore peigné	<i>Inonotus cuticularis</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten
Polypore pied-de-chèvre	<i>Scutigera pes-caprae</i> (Pers. : Fr.) Bondarzew & Singer
Polypore placenta	<i>Postia placenta</i> (Fr.) M.J. Larsen & Lombard
Polypore résineux	<i>Ischnoderma resinatum</i> (Schrad. : Fr.) P. Karsten
Polypore robuste	<i>Phellinus robustus</i> (P. Karsten) Bourdot & Galzin
Polypore rose	<i>Fomitopsis rosea</i> (Alb. & Schw. : Fr.) P. Karsten
Polypore rouillé	<i>Phellinus torulosus</i> (Pers.) Bourdot & Galzin
Polypore roux	<i>Inonotus rheades</i> (Pers.) P. Karsten
Polypore rutilant	<i>Hapalopilus rutilans</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten
Polypore safran	<i>Hapalopilus croceus</i> (Pers. : Fr.) Bondartzew & Singer
Polypore sanguinolent	<i>Physisporinus sanguinolentus</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Pilát
Polypore sosie	<i>Oxyporus obducens</i> (Pers.) Donk
Polypore soufre	<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull. : Fr.) Murrill
Polypore souris	<i>Postia tephroleuca</i> (Fr. : Fr.) Jülich
Polypore spongieux	<i>Spongipellis delectans</i> (Peck) Murrill

Noms français retenus	Noms latins
Polypore stratifié	<i>Oxyporus populinus</i> (Schum. : Fr.) Donk
Polypore tomenteux	<i>Inonotus tomentosus</i> (Fr. : Fr.) Teng
Polypore triangulaire	<i>Onnia triquetra</i> (Alb. & Schw. → Lenz) Imazeki
Polypore variable	<i>Polyporus leptcephalus</i> (Jacq. : Fr.) Fr.
Polypore vitreux	<i>Physisporinus vitreus</i> (Pers.:Fr.) P. Karsten
Polypore vivace	<i>Coltricia perennis</i> (L. : Fr.) S.F. Gray
Polypore vorace	<i>Antrodiella serpula</i> (P. Karsten) Spirin & Niemelä
Russule à lames âcres	<i>Russula acrifolia</i> Romagnesi ex Romagnesi
Russule à lames fourchues	<i>Russula heterophylla</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Russule à lames fragiles	<i>Russula romellii</i> R. Maire
Russule à lames glauques	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola
Russule à lames serrées	<i>Russula densifolia</i> Gillet
Russule à odeur d'anis	<i>Russula fragrantissima</i> Romagnesi
Russule à odeur de baudruce	<i>Russula praetervisa</i> Sarnari
Russule à odeur de géranium	<i>Russula pelargonica</i> Niolle
Russule à odeur de miel	<i>Russula melliolens</i> Quélet
Russule à odeur de topinambour	<i>Russula amoenolens</i> Romagnesi
Russule à odeur spermatique	<i>Russula sororia</i> (Fr.) Romell
Russule à pied brunissant	<i>Russula viscida</i> Kudrna
Russule à pied carmin	<i>Russula carminipes</i> Blum
Russule à pied court	<i>Russula curtipes</i> F.H. Møller & J. Schäffer
Russule à pied creux	<i>Russula cavipes</i> Britzelmayr
Russule à pied farci	<i>Russula medullata</i> Romagnesi ex Romagnesi
Russule à pied farineux	<i>Russula farinipes</i> Romell
Russule à pied fragile	<i>Russula terenopus</i> Romagnesi
Russule à pied rouge	<i>Russula rhodopus</i> Zvara
Russule à pied teinté	<i>Russula tinctipes</i> Blum ex M. Bon
Russule à pied violet	<i>Russula violeipes</i> Quélet
Russule à sporée ocre	<i>Russula ochrospora</i> (Nicolai ex Quadraccia & W. Rossi) Quadraccia
Russule à spores géantes	<i>Russula gigasperma</i> Romagnesi ex Romagnesi
Russule à voile jaune	<i>Russula insignis</i> Quélet
Russule alutacée	<i>Russula alutacea</i> (Pers. : Fr.) Fr.
Russule améthyste	<i>Russula amethystina</i> Quélet
Russule anthracite	<i>Russula anthracina</i> Romagnesi
Russule anthracite à lames carnées	<i>Russula anthracina</i> var. <i>carneifolia</i> Romagnesi
Russule anthracite insipide	<i>Russula anthracina</i> var. <i>insipida</i> Romagnesi
Russule aqueuse	<i>Russula aquosa</i> Leclair
Russule aurore	<i>Russula aurora</i> Krombholz
Russule azurée	<i>Russula azurea</i> Bresadola
Russule bâtarde	<i>Russula adulterina</i> (Fr.) Peck
Russule belette	<i>Russula mustelina</i> Fr.
Russule bistre	<i>Russula consobrina</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Russule blanche et noire	<i>Russula albonigra</i> (Krombholz) Fr.
Russule bleu-vert	<i>Russula parazurea</i> J. Schäffer
Russule bouton de rose	<i>Russula roseicolor</i> Blum
Russule bretonne	<i>Russula armoricana</i> Romagnesi & Le Gal
Russule brillante des bouleaux	<i>Russula nitida</i> (Pers. : Fr.) Fr.
Russule brillante des sphaignes	<i>Russula nitida</i> f. <i>heterosperma</i> (Singer) M. Bon
Russule brûlante	<i>Russula urens</i> Romell ex Singer
Russule brûlée	<i>Russula adusta</i> (Pers. : Fr.) Fr.
Russule brûlée des sables	<i>Russula adusta</i> var. <i>sabulosa</i> (Heim & Blum) ex M. Bon
Russule brun vineux	<i>Russula vinosobrunnea</i> (Bresadola) Romagnesi

Noms français retenus	Noms latins
Russule brun violacé	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay
Russule caméléon	<i>Russula risigallina</i> (Batsch) Saccardo
Russule caméléon jaune et rose	<i>Russula risigallina</i> f. <i>luteorosella</i> (Britzelmayr) M. Bon
Russule carmin	<i>Russula taeniospora</i> Einhellinger
Russule champêtre	<i>Russula campestris</i> (Romagnesi) Romagnesi ex M. Bon
Russule charbonnière	<i>Russula cyanoxantha</i> (J.C. Sch.) Fr.
Russule charbonnière à pied dur	<i>Russula langei</i> M. Bon
Russule charbonnière craquelée	<i>Russula cutescra</i> Cooke
Russule charbonnière jaune-vert	<i>Russula cyanoxantha</i> var. <i>flavoviridis</i> (Romagnesi) Sarnari
Russule charbonnière verte	<i>Russula cyanoxantha</i> f. <i>peltereaui</i> Singer
Russule citrine	<i>Russula violeipes</i> f. <i>citrina</i> (Quélet) Romagnesi
Russule cocardée	<i>Russula turci</i> Bresadola
Russule coccinée	<i>Russula pseudointegra</i> Arnoult & Goris
Russule couleur de pêche	<i>Russula persicina</i> Krombholz
Russule couleur paille	<i>Russula straminea</i> Malençon
Russule cuivrée	<i>Russula cuprea</i> Krombholz
Russule de Barla	<i>Russula barlae</i> Quélet
Russule de fiel	<i>Russula fellea</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Russule de l'Artois	<i>Russula artesiana</i> M. Bon
Russule de Norvège	<i>Russula laccata</i> Huijsman
Russule de Quélet	<i>Russula queletii</i> Fr.
Russule de velours rouge	<i>Russula rubra</i> (Lamarck : Fr.) Fr.
Russule des aulnaies	<i>Russula pumila</i> Rouzeau & Massart
Russule des aulnes verts	<i>Russula alnetorum</i> Romagnesi
Russule des bourbiers	<i>Russula lutensis</i> Romagnesi & Le Gal
Russule des charmes	<i>Russula carpini</i> Girard & Heinemann
Russule des chênes verts	<i>Russula ilicis</i> Romagnesi, Chevassut & Privat
Russule des chênes-liège	<i>Russula suberretorum</i> Dagron
Russule des cistes	<i>Russula cistoadelpha</i> Moser & Trimbach
Russule des cistes de Montpellier	<i>Russula monspeliensis</i> Sarnari
Russule des dryades	<i>Russula dryadicola</i> Fellner & Landa
Russule des épicéas	<i>Russula integra</i> (L. : Fr.) R. Maire
Russule des genévriers	<i>Russula juniperina</i> Ubaldi
Russule des marais	<i>Russula paludosa</i> Britzelmayr
Russule des mélèzes	<i>Russula laricina</i> Velenovsky
Russule des peupliers blancs	<i>Russula clariana</i> Heim ex Kuyper & van Vuure
Russule des pinèdes	<i>Russula torulosa</i> Bresadola
Russule des saulaies alpines	<i>Russula saliceticola</i> (Singer) Kühner ex Knudsen & T. Borgen
Russule des terrils	<i>Russula pseudopuellaris</i> (M. Bon) M. Bon
Russule des trembles	<i>Russula melitodes</i> Romagnesi
Russule dorée	<i>Russula aurea</i> Pers.
Russule dorée, variété sans jaune	<i>Russula aurea</i> var. <i>axantha</i> (Romagnesi) M. Bon
Russule du Midi	<i>Russula helios</i> Malençon ex Sarnari
Russule écrevisse	<i>Russula xerampelina</i> (J.C. Sch.) Fr.
Russule écrevisse de montagne	<i>Russula favrei</i> Moser
Russule écrevisse des alpages	<i>Russula pascua</i> (F.H. Møller & J. Schäffer) Kühner
Russule écrevisse des bouleaux	<i>Russula clavipes</i> Velenovsky
Russule écrevisse des chênes	<i>Russula graveolens</i> Romell
Russule écrevisse des hêtres	<i>Russula faginea</i> Romagnesi ex Romagnesi
Russule écrevisse des saules	<i>Russula subrubens</i> (J.E. Lange) M. Bon
Russule écrevisse des saules nains	<i>Russula chamiteae</i> Kühner
Russule écrevisse pourpre	<i>Russula purpurata</i> (Crawshay) Romagnesi ex M. Bon
Russule écrevisse ridée	<i>Russula cicatricata</i> Romagnesi ex M. Bon

Noms français retenus	Noms latins
Russule émétique	<i>Russula emetica</i> (J.C. Sch. : Fr.) Pers.
Russule émétique compacte	<i>Russula nobilis</i> Velenovsky
Russule émétique des bouleaux	<i>Russula betularum</i> Hora
Russule émétique des chênes	<i>Russula silvestris</i> (Singer) Reumaux
Russule émétique des hêtres	<i>Russula fageticola</i> (Melzer) ex Lundell
Russule émétique grisonnante	<i>Russula griseascens</i> (M. Bon & Gaugué) L. Marti
Russule fausse rouge sombre	<i>Russula fuscorubroides</i> M. Bon
Russule fausse-aurore	<i>Russula lepidicolor</i> Romagnesi
Russule fausse-fétide	<i>Russula subfoetens</i> W.G. Smith
Russule faux-lactaire	<i>Russula delica</i> Fr.
Russule faux-lactaire à sporée crème	<i>Russula pallidospora</i> (Blum) ex Romagnesi
Russule faux-lactaire à sporée jaune	<i>Russula flavispora</i> (Blum) ex Romagnesi
Russule fétide	<i>Russula foetens</i> (Pers. : Fr.) Pers.
Russule fragile	<i>Russula fragilis</i> (Pers. : Fr.) Fr.
Russule fragile à centre noir	<i>Russula knauthii</i> (Singer) Kühner & Romagnesi ex Hora
Russule fragile trompeuse	<i>Russula fragilis</i> f. <i>fallax</i> (J.C. Sch.) Masee
Russule frangipane	<i>Russula laurocerasi</i> Melzer
Russule frangipane douce	<i>Russula fragrans</i> Romagnesi
Russule gaie	<i>Russula laeta</i> F.H. Møller & J. Schäffer
Russule glauque	<i>Russula atroglaucula</i> Einhellinger
Russule gracile	<i>Russula gracillima</i> J. Schäffer
Russule grise	<i>Russula grisea</i> (Pers. →) Fr.
Russule grise des peupliers	<i>Russula sublevispora</i> (Romagnesi) Romagnesi ex M. Bon
Russule hygrophore	<i>Russula camarophylla</i> Romagnesi
Russule isabelle	<i>Russula cremeoavellanea</i> Singer
Russule jaune noircissante	<i>Russula claroflava</i> Grove
Russule jaune pâle	<i>Russula raoultii</i> Quélet
Russule jaunissante	<i>Russula luteotacta</i> Rea
Russule jeune fille	<i>Russula puellaris</i> Fr.
Russule jolie	<i>Russula lepida</i> Fr.
Russule jouvencelle	<i>Russula zonatula</i> Ebbensen & J. Schäffer
Russule laiteuse	<i>Russula galochroa</i> (Fr.) Saccardo
Russule lie-de-vin	<i>Russula vinosopurpurea</i> J. Schäffer
Russule lilas	<i>Russula lilacea</i> Quélet
Russule maculée	<i>Russula maculata</i> Quélet
Russule mal lavée	<i>Russula illota</i> Romagnesi
Russule mamelonnée	<i>Russula amara</i> Kucera
Russule mimétique	<i>Russula emeticicolor</i> J. Schäffer
Russule minuscule	<i>Russula minutula</i> Velenovsky
Russule naine	<i>Russula nana</i> Killerman
Russule noire	<i>Russula densissima</i> (J. Schäffer) ex Romagnesi
Russule noircie	<i>Russula seperina</i> Dupain
Russule noircissante	<i>Russula nigricans</i> (Bull. →) Fr.
Russule ochracée	<i>Russula ochracea</i> (Pers. : Fr.) Fr.
Russule ocre et blanche	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.
Russule odorante	<i>Russula odorata</i> Romagnesi
Russule olivacée	<i>Russula olivacea</i> (J.C. Sch.) Fr.
Russule olivacée des chênes verts	<i>Russula vinosobrunnea</i> var. <i>paraolivacea</i> M. Bon
Russule olivâtre	<i>Russula olivascens</i> (Pers. →) Fr.
Russule orangée grisonnante	<i>Russula decolorans</i> (Fr. : Fr.) Fr.
Russule pâlisante	<i>Russula exalbicans</i> (Pers.) Melzer & Zvara
Russule panachée	<i>Russula amoenicolor</i> Romagnesi ex Romagnesi

Noms français retenus	Noms latins
Russule pastel	<i>Russula subterfucata</i> Romagnesi ex Romagnesi
Russule pectinée	<i>Russula pectinata</i> Fr.
Russule perfide	<i>Russula badia</i> Quélet
Russule petite pomme	<i>Russula firmula</i> J. Schäffer
Russule plume de canard	<i>Russula anatina</i> Romagnesi ex Romagnesi
Russule polychrome	<i>Russula poikilochroa</i> Sarnari
Russule pourpre et noire	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr
Russule pourpre et noire décolorée	<i>Russula atropurpurea</i> var. <i>depallens</i> (Pers. : Fr.) R. Maire
Russule précoce	<i>Russula nauseosa</i> (Pers.) Fr.
Russule rose bonbon	<i>Russula veternosa</i> Fr.
Russule rose tendre	<i>Russula zvarae</i> Velenovsky
Russule rouge cuivre	<i>Russula velenovskyi</i> Melzer & Zvara
Russule rouge des bouleaux	<i>Russula intermedia</i> P. Karsten
Russule rouge et blanche	<i>Russula rubroalba</i> (Singer) Romagnesi
Russule rouge et noire	<i>Russula atrorubens</i> Quélet
Russule rouge sombre	<i>Russula fuscorubra</i> (Bresadola) Blum
Russule rutilante	<i>Russula rutila</i> Romagnesi ex Romagnesi
Russule sang de bœuf	<i>Russula amoenicolor</i> f. <i>nigrosanguinea</i> Romagnesi [<i>inval.</i>]
Russule sanguine	<i>Russula sanguinaria</i> (Bull. → Schum.) S. Rauschert
Russule sanguine des marais	<i>Russula helodes</i> Melzer
Russule sanguine jaunissante	<i>Russula sanguinaria</i> f. <i>pseudorosacea</i> (R. Maire) M. Bon
Russule sardoine	<i>Russula sardonica</i> Fr.
Russule sardoine jaune	<i>Russula sardonica</i> var. <i>mellina</i> Melzer
Russule saumonée des bouleaux	<i>Russula font-queri</i> Singer ex Singer
Russule soleil	<i>Russula solaris</i> Ferdinansen & Winge
Russule soyeuse	<i>Russula sericatula</i> Romagnesi
Russule tache-de-sang	<i>Russula melzeri</i> Zvara
Russule tardive	<i>Russula cessans</i> A. Pearson
Russule timide	<i>Russula puellula</i> Ebbensen, F.H. Møller & J. Schäffer
Russule très amère	<i>Russula amarissima</i> Romagnesi & E.-J. Gilbert
Russule trompeuse	<i>Russula decipiens</i> (Singer) Kühner & Romagnesi ex Svrček
Russule veloutée	<i>Russula amoena</i> Quélet
Russule verdoyante	<i>Russula virescens</i> (J.C. Sch.) Fr.
Russule versatile	<i>Russula versatilis</i> Romagnesi
Russule versicolore	<i>Russula versicolor</i> J. Schäffer
Russule vert-de-gris	<i>Russula aeruginea</i> Lindblad
Russule verte et violette	<i>Russula ionochlora</i> Romagnesi ex Romagnesi
Russule vieux-rose	<i>Russula vesca</i> Fr.
Russule vinaigrée	<i>Russula acetolens</i> S. Rauschert
Russule vineuse	<i>Russula vinosa</i> Lindblad
Russule violacée	<i>Russula violacea</i> Quélet
Schizophylle commun	<i>Schizophyllum commune</i> Fr. : Fr.
Tramète à ligne noire	<i>Cerrena unicolor</i> (Bull. : Fr.) Murrill
Tramète à odeur d'abricot	<i>Datronia mollis</i> (Sommerfelt : Fr.) Donk
Tramète bicolore	<i>Gloeoporus dichrous</i> (Fr. : Fr.) Bresadola
Tramète blanc de neige	<i>Skeletocutis nivea</i> (Junghuhn) Keller
Tramète bossue	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.
Tramète brûlée	<i>Bjerkandera adusta</i> (Willdenow : Fr.) P. Karsten
Tramète cinabre	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq. : Fr.) P. Karsten
Tramète déchirée	<i>Trichaptum hollii</i> (J.C. Schmidt : Fr.) Kreisel
Tramète des Gaules	<i>Funalia gallica</i> (Fr. : Fr.) Bondarzew & Singer
Tramète du chêne-liège	<i>Trichaptum biforme</i> (Fr.) Ryvarden
Tramète du mélèze	<i>Trichaptum laricinum</i> (Karsten) Ryvarden

Noms français retenus	Noms latins
Tramète du peuplier	<i>Funalia trogii</i> (Berk.) Bondarzew & Singer
Tramète enfumée	<i>Bjerkandera fumosa</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten
Tramète hirsute	<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen : Fr.) Pilát
Tramète lilas	<i>Trichaptum abietinum</i> (Dicks. : Fr.) Ryvarden
Tramète parfumée	<i>Trametes suaveolens</i> (L. : Fr.) Fr.
Tramète pubescente	<i>Trametes pubescens</i> (Schum. : Fr.) Pilát
Tramète rougissante	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolt. : Fr.) J. Schröter
Tramète saumonée	<i>Skeletocutis amorpha</i> (Fr. : Fr.) Kotlaba & Pouzar
Tramète veloutée	<i>Trametes velutinus</i> (Planer ex Fries) Cunn.
Tramète versicolore	<i>Trametes versicolor</i> (L. : Fr.) Lloyd
Tramète zonée	<i>Trametes ochracea</i> (Pers.) Gilbertson & Ryvarden
Tricholome savonneux ardoisé	<i>Tricholoma saponaceum</i> f. <i>ardosiacum</i> (Bresadola) M. Bon
Tricholome à base rouge	<i>Tricholoma basirubens</i> (M. Bon) Riva & M. Bon
Tricholome à chair brune	<i>Melanoleuca polioleuca</i> (Fr. : Fr.) Kühner & R. Maire
Tricholome à grand chapeau	<i>Porpoloma macrocephalum</i> (Bohus) M. Bon
Tricholome à lames jaunes	<i>Tricholoma chrysophyllum</i> Riva, C. E. Hermosilla & J. Sánchez
Tricholome à lames triangulaires	<i>Dermoloma cuneifolium</i> (Fr. : Fr.) M. Bon
Tricholome à marge jaune	<i>Tricholoma coryphaeum</i> (Fr.) Gillet
Tricholome à marge rouge	<i>Tricholoma orirubens</i> Quélet
Tricholome à odeur de gaz	<i>Tricholoma inamoenum</i> (Fr. : Fr.) Gillet
Tricholome à odeur d'iris	<i>Lepista irina</i> (Fr.) Bigelow
Tricholome à pied bicolore	<i>Tricholoma batschii</i> M. Christensen & Noordeloos
Tricholome à pied court	<i>Melanoleuca brevipes</i> (Bull. : Fr.) Patouillard
Tricholome à pied écailleux	<i>Tricholoma squarrulosum</i> Bresadola
Tricholome à pied obèse	<i>Lyophyllum rhopalopodium</i> Cléménçon
Tricholome à pied rayé	<i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull. : Fr.) Patouillard
Tricholome à pied roux	<i>Melanoleuca rufipes</i> M. Bon
Tricholome à pied verruqueux	<i>Melanoleuca verrucipes</i> (Fr.) Singer
Tricholome à sporée jaune	<i>Melanoleuca luteolosperma</i> (Britzelmayr) Singer
Tricholome à squames noires	<i>Tricholoma atosquamosum</i> Saccardo
Tricholome acerbe rose	<i>Tricholoma roseoacervum</i> Riva
Tricholome amer	<i>Lyophyllum amariusculum</i> Cléménçon
Tricholome âpre	<i>Tricholoma acerbum</i> (Bull. : Fr.) Quélet
Tricholome argenté	<i>Tricholoma argyraceum</i> (Bull.) Gillet
Tricholome arqué	<i>Melanoleuca arcuata</i> (Bull. : Fr.) Singer
Tricholome bistre	<i>Lyophyllum infumatum</i> (Bresadola) Kühner
Tricholome blafard	<i>Tricholoma luridum</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer
Tricholome blanc	<i>Tricholoma album</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer
Tricholome blanc des bouleaux	<i>Tricholoma stiparophyllum</i> (Lund) P. Karsten
Tricholome blanc radicant	<i>Tricholomella leucocephala</i> (Bull. : Fr.) M. Bon
Tricholome blanchâtre	<i>Melanoleuca evenosa</i> (Saccardo) Konrad & Maublanc
Tricholome bleuissant	<i>Lyophyllum caeruleascens</i> Cléménçon
Tricholome brûlant	<i>Tricholoma aestuans</i> (Fr. : Fr.) Gillet
Tricholome brûlé	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer
Tricholome brûlé amer	<i>Tricholoma ustaloides</i> Romagnesi
Tricholome brun et blanc	<i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers. : Fr.) Kummer
Tricholome brun-rose	<i>Gerhardtia borealis</i> (Fr.) Contu & A. Ortega
Tricholome cartilagineux	<i>Lyophyllum loricatum</i> (Fr.) Kalamees
Tricholome ceinturé	<i>Tricholoma cingulatum</i> (Almf. : Fr.) Jacobasch
Tricholome céleri	<i>Tricholoma apium</i> J. Schäffer
Tricholome chaussé	<i>Tricholoma caligatum</i> (Viviani) Ricken
Tricholome colombette	<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr. : Fr.) Kummer
Tricholome colosse	<i>Tricholoma colossus</i> (Fr.) Quélet

Noms français retenus	Noms latins
Tricholome conique	<i>Tricholoma inocybeoides</i> A. Pearson
Tricholome couleur de vache	<i>Tricholoma vaccinum</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer
Tricholome cravaté	<i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Ricken
Tricholome d'Algérie	<i>Trichosporum cossonianum</i> (R. Maire) P.-A. Moreau & Contu
Tricholome d'Auvergne	<i>Tricholoma arvernense</i> M. Bon
Tricholome de Joachim	<i>Tricholoma joachimii</i> M. Bon & Riva
Tricholome de la dune blanche	<i>Melanoleuca cinereifolia</i> (M. Bon) M. Bon
Tricholome de la Saint-Georges	<i>Calocybe gambosa</i> (Fr. : Fr.) Donk
Tricholome décoré	<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr. : Fr.) Singer
Tricholome des cèdres	<i>Tricholoma cedretorum</i> (M. Bon) Riva
Tricholome des cèdres, variété pâle	<i>Tricholoma cedretorum</i> var. <i>ochraceopallidum</i> (M. Bon) Riva
Tricholome des cyprès	<i>Lyophyllum hypoxanthum</i> Jossierand & L. Rioussset
Tricholome des eucalyptus	<i>Lyophyllum buxum</i> (R. Maire) Konrad & Maublanc
Tricholome des pelouses	<i>Dermoloma pseudocuneifolium</i> M. Bon
Tricholome des peupliers	<i>Tricholoma populinum</i> J.E. Lange
Tricholome doré	<i>Tricholoma auratum</i> (L. : Fr.) Gillet
Tricholome écoeurant	<i>Tricholoma lascivum</i> (Fr. : Fr.) Gillet
Tricholome élancé	<i>Tricholoma stans</i> (Fr.) Saccardo
Tricholome en touffes	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr. : Fr.) Singer
Tricholome enfumé	<i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers. : Fr.) P.D. Orton
Tricholome équestre	<i>Tricholoma equestre</i> (L. : Fr.) Kummer
Tricholome équestre des peupliers	<i>Tricholoma frondosae</i> Kalamees & Shtshukin
Tricholome farineux des pins	<i>Tricholoma pessundatum</i> (Fr. : Fr.) Quélet
Tricholome farineux jaunissant	<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.) Quélet
Tricholome fauve	<i>Tricholoma fulvum</i> (Retz. : Fr.) Costantin & Dufour
Tricholome faux-prétentieux	<i>Tricholoma josserandii</i> M. Bon
Tricholome géant	<i>Melanoleuca subbrevipes</i> M. Bon
Tricholome gracile des dunes	<i>Melanoleuca pseudoluscina</i> M. Bon
Tricholome gracile des pelouses	<i>Melanoleuca rasilis</i> (Fr.) Singer
Tricholome gris de plomb	<i>Porpoloma elytroides</i> (Fr.) Singer
Tricholome gris glauque	<i>Lepista glaucocana</i> (Bresadola) Singer
Tricholome gris perfide	<i>Tricholoma sciodes</i> (Pers.) C. Martin
Tricholome gris sombre	<i>Dermoloma atrocinerum</i> (Pers.) P.D. Orton
Tricholome gris souris	<i>Melanoleuca kuehneri</i> M. Bon
Tricholome imbriqué	<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr. : Fr.) Kummer
Tricholome ivoire	<i>Tricholoma albidum</i> M. Bon
Tricholome jaunet	<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sow. : Fr.) Quélet
Tricholome jaunet des conifères	<i>Tricholoma sejunctum</i> var. <i>coniferarum</i> M. Bon
Tricholome jaune-vert	<i>Floccularia straminea</i> (Krombholz Kummer) Pouzar
Tricholome jaunissant	<i>Tricholoma sulfurescens</i> Bresadola
Tricholome lilas	<i>Lepista sordida</i> var. <i>lilacea</i> (Quélet) M. Bon
Tricholome luisant	<i>Tricholoma pseudonictitans</i> M. Bon
Tricholome malodorant	<i>Lepista graveolens</i> (Peck) Dermek
Tricholome neutre	<i>Trichosporum goniospermum</i> (Bresadola) Baroni
Tricholome noir et blanc	<i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers. : Fr.) Murrill
Tricholome omboné	<i>Tricholoma umbonatum</i> (J.E. Lange) Cléménçon & M. Bon
Tricholome orangé	<i>Tricholoma aurantium</i> (J.C. Sch. : Fr.) Ricken
Tricholome orné	<i>Tricholomopsis ornata</i> (Fr.) Singer
Tricholome parfumé	<i>Porpoloma spinulosum</i> (Kühner & Romagnesi) Singer
Tricholome peau de chamois	<i>Lyophyllum transforme</i> (Britzelmayer) Singer
Tricholome petite flamme	<i>Tricholomopsis flammula</i> (Métrod ex E. Ludwig) P.-A. Moreau & Courtecuisse
Tricholome pied de chèvre	<i>Porpoloma pes-caprae</i> (Fr.) Singer

Noms français retenus	Noms latins
Tricholome poivré	<i>Gerhardtia piperata</i> (A.H. Smith) M. Bon
Tricholome pourpré	<i>Tricholoma bufonium</i> (Pers. : Fr.) Gillet
Tricholome prétentieux	<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr. : Fr.) Quélet
Tricholome pruineux	<i>Melanoleuca subpulverulenta</i> (Pers.) Singer
Tricholome radican	<i>Porpoloma macrorrhizum</i> (Saccardo) M. Bon
Tricholome râpeux	<i>Lyophyllum gangraenosum</i> (Fr.) G. Gulden
Tricholome rougissant	<i>Porpoloma metapodium</i> (Fr.) Singer
Tricholome rutilant	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (J.C. Sch. : Fr.) Singer
Tricholome sablé	<i>Tricholoma psammopus</i> (Kalchbrenner) Quélet
Tricholome salissant	<i>Lyophyllum semitale</i> (Fr. : Fr.) Kalamees
Tricholome saumoné	<i>Melanoleuca cognata</i> (Fr.) Konrad & Maublanc
Tricholome savonneux	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr. : Fr.) Kummer
Tricholome savonneux à écailles	<i>Tricholoma saponaceum</i> var. <i>squamosum</i> (Cooke) Rea
Tricholome savonneux à lames jaunes	<i>Tricholoma saponaceum</i> var. <i>napipes</i> (Krombholz) Barla
Tricholome soufré	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull. : Fr.) Kummer
Tricholome soufré des montagnes	<i>Tricholoma hemisulphureum</i> (M. Bon) Riva
Tricholome soufré forme crapaudine	<i>Tricholoma sulphureum</i> var. <i>coronarium</i> (Pers.) Gillet
Tricholome suave	<i>Melanoleuca kuehneri</i> var. <i>iris</i> (Kühner) M. Bon
Tricholome surbaissé	<i>Melanoleuca curtipes</i> (Fr. : Fr.) M. Bon
Tricholome terreux OU Petit-gris	<i>Tricholoma terreum</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer
Tricholome terreux blanc	<i>Tricholoma leucoterreum</i> Mariotto & Turetta
Tricholome tigré	<i>Tricholoma pardinum</i> (Pers.) Quélet
Tricholome tigré pâle	<i>Tricholoma filamentosum</i> (Alessio) Alessio
Tricholome triste	<i>Tricholoma triste</i> (Scop. : Fr.) Quélet
Tricholome urbain	<i>Tricholomella constricta</i> (Fr. : Fr.) Kalamees
Tricholome vergeté	<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr. : Fr.) Kummer
Tricholome vergeté des feuillus	<i>Tricholoma bresadolanum</i> Cléménçon
Tricholome violet et jaune	<i>Lyophyllum favrei</i> (R. Haller & R. Haller Suhr) R. Haller & R. Haller Suhr
Trompette jaune	<i>Craterellus konradii</i> Bourdot & R. Maire
Trompette-de-la-mort / des morts	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers.
Typhule à pied rouge	<i>Typhula erythropus</i> (Pers. : Fr.) Fr.
Typhule blanche des fruits	<i>Typhula fruticum</i> (P. Karsten) P. Karsten
Typhule brillante	<i>Typhula micans</i> (Pers. : Fr.) Berthier
Typhule corail	<i>Typhula corallina</i> Quélet & Patouillard
Typhule des chaumes	<i>Typhula culmigena</i> (Montagne & Fr.) J. Schröter
Typhule des sapins	<i>Typhula abietina</i> (Fuckel) Corner
Typhule variable	<i>Typhula subvariabilis</i> Berthier